

Математическая логика и логическое программирование

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

e-mail:

valdus@yandex.ru

2016, весенний семестр

Лекция 8

Резолютивный вывод


Корректность резолютивного вывода

Применение метода резолюций

Эрбрановские интерпретации

Теорема Эрбрана

Общая схема метода резолюций



Общая схема метода резолюций



Резолютивный вывод

Ещё немного определений

Положительная литерा — это атом

Отрицательная литерा — это отрицание атома

Пусть E — логическое выражение и θ — подстановка

Тогда

- ▶ $E\theta$ — пример выражения E
- ▶ если $\text{Var}_{E\theta} = \emptyset$, то $E\theta$ — основной пример
- ▶ если $\theta : \text{Var} \rightarrow \text{Var}$ — биекция, то
 - ▶ θ — переименование
 - ▶ $E\theta$ — вариант выражения E

Резолютивный вывод

Пример

Рассмотрим выражение $E = P(x, f(y)) \vee \neg R(y, c)$
и подстановки

$$\begin{aligned}\theta &= \{x/u, y/z, u/x, z/y\} \\ \eta &= \{x/g(d), y/z\} \\ \mu &= \{z/c\} \\ \varepsilon &= \{\}\end{aligned}$$

Тогда:

- ▶ $E\eta = P(g(d), f(z)) \vee \neg R(z, c)$ — пример выражения E
- ▶ $E\eta\mu = P(g(d), f(c)) \vee \neg R(c, c)$ — основной пример выражения E
- ▶ подстановки θ и ε — переименования
- ▶ $E\theta = P(u, f(z)) \vee \neg R(z, c)$ — вариант выражения E

Резолютивный вывод

Правило резолюции

$$\frac{D_1 \vee L_1, D_2 \vee \neg L_2}{(D_1 \vee D_2)\theta}$$

Здесь

- ▶ D_1, D_2 — дизъюнкты
- ▶ L_1, L_2 — положительные литеры
- ▶ $\theta \in \text{НОУ}(L_1, L_2)$

Дизъюнкт $(D_1 \vee D_2)\theta$ — резольвента

дизъюнктов $D_1 \vee L_1, D_2 \vee \neg L_2$

Литеры $L_1, \neg L_2$ образуют контрапарную пару

Резолютивный вывод

Пример

контрарная пара

$$\frac{P(x, f(y)) \vee \neg R(g(x, z), f(z)) \quad Q(x) \vee R(y, x) \vee \neg P(g(z, y), z)}{\neg R(g(g(f(y), y), f(y)), f(f(y))) \vee Q(g(f(y), y)) \vee R(y, g(f(y), y))}$$


↑
резольвента

$$\theta = \{x/g(f(y), y), z/f(y)\} \in HOY(P(x, f(y)), P(g(z, y), z))$$

резольвента: $(\neg R(g(x, z), f(z)) \vee Q(x) \vee R(y, x))\theta$

Резолютивный вывод

Пример




$$\theta = \{x/f(z), y/g(f(z), z)\} \in HOY(R(g(x, z), f(z)), R(y, x))$$

резольвента: $(P(x, f(y)) \vee Q(x) \vee \neg P(g(z, y), z))\theta$

Резолютивный вывод

Пример




$$\theta = \{y/g(v), u/f(x)\} \in HOY(P(f(x), y), P(u, g(v)))$$

резольвента: (**???**) θ

Резолютивный вывод

Пример



$$\theta = \{y/g(v), u/f(x)\} \in \text{НОУ}(P(f(x), y), P(u, g(v)))$$

резольвента: $(\text{false} \vee \text{false})\theta$

Резолютивный вывод

Достаточно ли правила резолюции для выявления всех противоречий?

Оказывается, что нет. Например:

$$\begin{aligned} P(x) \vee P(c) \\ \neg P(c) \vee \neg P(y) \end{aligned}$$

Система из таких двух дизъюнктов **противоречива**, но по правилу резолюции из них всегда будут получаться дизъюнкты **ровно с двумя литерами**

Необходимо иметь правило, которое позволяет работать и с такими системами дизъюнктов

Резолютивный вывод

Правило склейки

$$\frac{D \vee L_1 \vee L_2}{(D \vee L_1)\theta}$$

Здесь


- ▶ D — дизъюнкт
- ▶ L_1, L_2 — литеры
- ▶ $\theta \in \text{НОУ}(L_1, L_2)$

Дизъюнкт $(D \vee L_1)\theta$ — склейка дизъюнкта $D \vee L_1 \vee L_2$

Литеры L_1, L_2 образуют склеиваемую пару

Резолютивный вывод

Пример



$$\theta = \{x/c, y/c, z/f(c)\} \in HOY(\neg R(y, z, f(x)), \neg R(x, f(c), z))$$

склейка: $(P(x) \vee \neg R(y, z, f(x)))\theta$

Резолютивный вывод

Пусть S — система дизъюнктов

Резолютивный вывод из S — это конечная последовательность дизъюнктов

$$D'_1, \dots, D'_i, \dots, D'_k,$$

такая что каждый дизъюнкт D'_i является

- ▶ вариантом дизъюнкта из S ,
- ▶ склейкой дизъюнкта D'_j , где $j < i$, или
- ▶ резольвентой дизъюнктов D'_j, D'_m , где $j < i$ и $m < i$

Дизъюнкт **резолютивно выводим** из S , если существует резолютивный вывод из S , оканчивающийся этим дизъюнктом


Резолютивный вывод

Пример

$S = \{D_1, D_2, D_3\}$, где

$$D_1 = P(x, f(y)) \vee R(y) \quad D_2 = \neg R(y)$$
$$D_3 = \neg P(f(x), z) \vee \neg P(y, y)$$

Резолютивный вывод:



Пустой дизъюнкт резолютивно выводим из системы S

Резолютивный вывод

Насколько важно начинать с вариантов дизъюнктов,
а не только с самих дизъюнктов?

Рассмотрим такую систему:

$$S = \{\neg P(x), P(f(x))\}$$

$$\text{НОУ}(P(x), P(f(x))) = \emptyset$$

Значит, у этих дизъюнктов нет ни одной резольвенты, а у некоторых их вариантов — есть

При этом система S противоречива:

у формул $\forall x \neg P(x)$ и $\forall x P(f(x))$ нет общих моделей

А почему мы можем переименовывать переменные?

$$\forall x \varphi \approx \forall y (\varphi \{x/y\}), \text{ если } <\dots>$$

Резолютивный вывод

Резолютивный вывод **успешен** (является **резолютивным опровержением**), если он оканчивается пустым дизъюнктом \square

А в чём успешность такого вывода?

И что в нём опровергается?

Каждый шаг построения вывода можно трактовать так:

- ▶ предположим, что система, полученная из исходной добавлением всех выведенных дизъюнктов, выполнима
- ▶ тогда система останется выполнимой, если к ней добавить такой дизъюнкт: $\langle \dots \rangle$

Выводимость \square опровергает предположение о выполнимости исходной системы и этим успешно доказывает её невыполнимость

Но это ещё нужно обосновать

Корректность резолютивного вывода

Теорема корректности резолютивного вывода

Если из системы дизъюнктов S резолютивно выводим пустой дизъюнкт, то S — противоречивая система

Доказательство теоремы.

Если $S \models \square$, то система S противоречива,
так как дизъюнкт \square не имеет модели

Покажем, что любой дизъюнкт, резолютивно выводимый из S , является логическим следствием S

Достаточно доказать следующее:

- ▶ **вариант** дизъюнкта D логически следует из D
(это очевидно)
- ▶ **резольвента** дизъюнктов D_1 и D_2
логически следует из D_1, D_2
- ▶ **склейка** дизъюнкта D логически следует из D

Корректность резолютивного вывода

Лемма корректности правила резолюции

Если D — резольвента дизъюнктов D_1, D_2 , то $D_1, D_2 \models D$

Доказательство леммы.

Пусть $D_1 = D'_1 \vee L_1$, $D_2 = D'_2 \vee \neg L_2$, $\theta \in \text{HOУ}(L_1, L_2)$,
 $D = (D'_1 \vee D'_2)\theta$ и $L_1\theta = L_2\theta = L$

Тогда будет верно:

(кванторы опущены)

$$D_1 \models D_1\theta$$

$$D_2 \models D_2\theta$$

$$D_1 \models D'_1\theta \vee L_1\theta$$

$$D_2 \models D'_2\theta \vee \neg L_2\theta$$

$$D_1 \models D'_1\theta \vee L$$

$$D_2 \models D'_2\theta \vee \neg L$$

$$D_1, D_2 \models D'_1\theta \vee L$$

$$D_1, D_2 \models D'_2\theta \vee \neg L$$

$$D_1, D_2 \models D'_1\theta \vee D'_2\theta \vee L$$

$$D_1, D_2 \models D'_1\theta \vee D'_2\theta \vee \neg L$$

Заметим, что

(очевидно?)

если $\Gamma \models A \vee B$ и $\Gamma \models A \vee \neg B$, то $\Gamma \models A$

Тогда $D_1, D_2 \models D'_1\theta \vee D'_2\theta$

То есть $D_1, D_2 \models D$



Корректность резолютивного вывода

Лемма корректности правила склейки

Если D — склейка дизъюнкта D_1 , то $D_1 \models D$

Доказательство леммы.

Похоже на доказательство корректности правила резолюции
(то есть доказать самостоятельно)



Применение метода резолюций

Вспомним, для чего вводился резолютивный вывод

Рассмотрим такую формулу:

$$\varphi : \exists x (P(x) \& (\forall x P(x) \rightarrow \exists y R(x, y)) \rightarrow \exists y R(x, y))$$

Задача: проверить общезначимость φ

$$\models \varphi ?$$

Покажем, как эта задача решается с помощью

метода резолюций

Применение метода резолюций

Решение

Этап 1. Перейти к проверке противоречивости отрицания $\psi = \neg\varphi$

$$\neg\exists x (P(x) \& (\forall x P(x) \rightarrow \exists y R(x, y)) \rightarrow \exists y R(x, y))$$

Этап 2. Построить равносильную

предварённую нормальную форму ψ_{pnf}

$$\forall x \exists z \exists y \forall u (P(x) \& (\neg P(z) \vee R(x, y)) \& \neg R(x, u))$$

Этап 3. Построить равновыполнимую

сколемовскую стандартную форму ψ_{ssf}

$$\forall x \forall u (P(x) \& (\neg P(f(x)) \vee R(x, g(x))) \& \neg R(x, u))$$

Этап 4. Перейти к проверке противоречивости системы S_φ


$$\left\{ \begin{array}{c} P(x) \\ \neg P(f(x)) \vee R(x, g(x)) \\ \neg R(x, u) \end{array} \right\}$$

Применение метода резолюций

Решение

Этап 5. Резолютивно вывести пустой дизъюнкт из S_φ

$$\left\{ \begin{array}{c} P(x) \\ \neg P(f(x)) \vee R(x, g(x)) \\ \neg R(x, u) \end{array} \right\}$$



Применение метода резолюций

Решение

Какой ответ и на каком основании мы получили?

Нами построен успешный резолютивный вывод пустого дизъюнкта из S_φ

Теорема корректности резолютивного вывода:

система S_φ противоречива

Безымянная теорема в лекции 6: ССФ ψ_{ssf} противоречива

Теорема о сколемизации: ПНФ ψ_{pnf} противоречива

Теорема о предварённой нормальной форме:

формула ψ противоречива

$\psi = \neg\varphi$: формула φ общезначима

Применение метода резолюций

Всё ли это, что следует знать про метод резолюций?

Для метода семантических таблиц были исследованы

- ▶ **корректность**: верно ли, что наличие успешного вывода означает общезначимость формулы
- ▶ **полнота**: верно ли, что для любой общезначимой формулы можно построить успешный вывод

А полон ли метод резолюций?

Построить систему дизъюнктов S_φ можно (очевидно) для любой формулы φ

А верно ли, что из любой противоречивой системы дизъюнктов резолютивно выводим пустой дизъюнкт?

Эрбрановские интерпретации

Что означает противоречивость системы дизъюнктов

$$S = \{D_1, \dots, D_k\}?$$

Для любой интерпретации \mathcal{I} найдутся дизъюнкт

$\forall \tilde{x}^n (L_1 \vee \dots \vee L_m)$ из S и набор предметов \tilde{d}^n , такие что

$$\mathcal{I} \not\models L_1[\tilde{d}^n], \quad \dots, \quad \mathcal{I} \not\models L_m[\tilde{d}^n]$$

А так ли необходимо перебирать все интерпретации и предметы для проверки противоречивости S ?

Например, для доказательства невыполнимости системы $\{P(x), \neg P(f(c))\}$ достаточно заметить, что независимо от выбора интерпретации \mathcal{I}

$$\text{либо } \mathcal{I} \not\models P(x)[\bar{f}(\bar{c})], \quad \text{либо } \mathcal{I} \not\models \neg P(f(c))$$

Пытаясь рассуждать о предметах, не отталкиваясь от их природы и используя только термальное представление, мы неизбежно приходим к эрбрановским интерпретациям

Эрбрановские интерпретации

В основе эрбрановских интерпретаций лежат

свободные алгебры термов¹

Эрбрановская интерпретация $\mathcal{I}_{\mathcal{H}} = \langle \mathcal{H}_{\sigma}, \overline{\text{Const}}_{\mathcal{H}}, \overline{\text{Func}}_{\mathcal{H}}, \overline{\text{Pred}} \rangle$

сигнатуры σ состоит из

- ▶ стандартной предметной области \mathcal{H}_{σ} :
эрбрановского универсума (или \mathcal{H} -универсума)
 - ▶ \mathcal{H}_{σ} — это множество всех основных термов² в σ
- ▶ стандартной оценки констант $\overline{\text{Const}}_{\mathcal{H}}$:
 - ▶ $\bar{c} = c$
- ▶ стандартной оценки функциональных символов $\overline{\text{Func}}_{\mathcal{H}}$:
 - ▶ $\bar{f}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$
- ▶ произвольной оценки предикатных символов $\overline{\text{Pred}}$

¹ Думали увидеть это название в лекции 7 и навсегда забыть —
но не тут-то было!

² Лекция 3: это термы, не содержащие переменных

Эрбрановские интерпретации

Чем хороши \mathcal{H} -интерпретации?

- ▶ Они отличаются **только** оценкой предикатных символов, то есть можно не задумываться о задании
 - ▶ предметной области:
 - ▶ это \mathcal{H} -универсум
 - ▶ оценки констант и функциональных символов:
 - ▶ значение основного терма — это сам терм
- ▶ *Что более важно:* для выяснения того, противоречива ли система дизъюнктов, достаточно рассмотреть **только** эрбрановские интерпретации

Эрбрановские интерпретации

Теорема об \mathcal{H} -интерпретациях

Система дизъюнктов выполнима тогда и только тогда, когда она имеет эрбрановскую модель

Доказательство.

(\Leftarrow): очевидно

(\Rightarrow): Пусть S — выполнимая система дизъюнктов
и $\mathcal{I} = \langle D_{\mathcal{I}}, \overline{\text{Const}}, \overline{\text{Func}}, \overline{\text{Pred}} \rangle$ — её модель (сигнатуры σ)

Рассмотрим такое отображение $\alpha : \mathcal{H}_{\sigma} \rightarrow D_{\mathcal{I}}$:

$\alpha(t)$ — значение **основного** терма t в интерпретации \mathcal{I}

Покажем, что моделью для S будет такая эрбрановская
интерпретация $\mathcal{I}_S = \langle \mathcal{H}_{\sigma}, \overline{\text{Const}}_S, \overline{\text{Func}}_S, \overline{\text{Pred}}_S \rangle$:

$$\overline{\overline{P}}(t_1, \dots, t_k) = \overline{P}(\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_k))$$

Эрбрановские интерпретации

Доказательство. (\Rightarrow):

Предположим, что \mathcal{I}_H не является моделью для S

Тогда существует дизъюнкт $A_1 \vee \dots \vee A_m \vee \neg B_1 \vee \dots \vee \neg B_q \in S$,
такой что $(A_i, B_j — \text{атомы})$

$$\mathcal{I}_H \not\models \forall \tilde{x}^n (A_1 \vee \dots \vee A_m \vee \neg B_1 \vee \dots \vee \neg B_q)$$

Значит, существуют основные термы (предметы H_σ) t_1, \dots, t_n ,
такие что

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_H \not\models A_1[t_1, \dots, t_n], \dots, \mathcal{I}_H \not\models A_m[t_1, \dots, t_n] \\ \mathcal{I}_H \models B_1[t_1, \dots, t_n], \dots, \mathcal{I}_H \models B_q[t_1, \dots, t_n]\end{aligned}$$

Отображение α — гомоморфизм интерпретации \mathcal{I}_H в
интерпретацию \mathcal{I} :

$$\bar{\mathbf{f}}(\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_k)) = \alpha(\mathbf{f}(t_1, \dots, t_k))$$

Значит, для любого атома A верно:

$$\mathcal{I}_H \models A[t_1, \dots, t_n] \Leftrightarrow \mathcal{I} \models A[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)]$$

Эрбрановские интерпретации

Доказательство. (\Rightarrow):

$$A_1 \vee \cdots \vee A_m \vee \neg B_1 \vee \cdots \vee \neg B_q \in S$$

$$\mathcal{I}_H \not\models A_1[t_1, \dots, t_n], \dots, \mathcal{I}_H \not\models A_m[t_1, \dots, t_n]$$

$$\mathcal{I}_H \models B_1[t_1, \dots, t_n], \dots, \mathcal{I}_H \models B_q[t_1, \dots, t_n]$$

$$\mathcal{I}_H \models A[t_1, \dots, t_n] \Leftrightarrow \mathcal{I} \models A[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)]$$

Тогда

$$\mathcal{I} \not\models A_1[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)], \dots, \mathcal{I} \not\models A_m[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)]$$

$$\mathcal{I} \models B_1[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)], \dots, \mathcal{I} \models B_q[\alpha(t_1), \dots, \alpha(t_n)]$$

и

$$\mathcal{I} \not\models \forall \tilde{x}^n (A_1 \vee \cdots \vee A_m \vee \neg B_1 \vee \cdots \vee \neg B_q)$$

Получено противоречие с тем, что \mathcal{I} — модель для S

Значит, предположение о том, что интерпретация \mathcal{I}_H не является моделью, неверно



Эрбрановские интерпретации

Можно ли удобно задавать \mathcal{H} -интерпретации?

Пусть $B_{\mathcal{H}}$ — это **эрбрановский базис**: множество всех основных атомов

\mathcal{H} -интерпретация \mathcal{I} **полностью** определяется тем, какие основные атомы в ней истинны, то есть множеством

$$B^{\mathcal{I}} = \{A \mid A \in B_{\mathcal{H}}, \mathcal{I} \models A\}$$

Например,

- ▶ если $B^{\mathcal{I}} = \emptyset$, то все основные атомы **ложны** в \mathcal{I}
- ▶ если $B^{\mathcal{I}} = B_{\mathcal{H}}$, то все основные атомы **истинны** в \mathcal{I}
- ▶ множество $B^{\mathcal{I}} \cap B^{\mathcal{J}}$ определяет интерпретацию, в которой истинны те и только те основные атомы, которые истинны в обеих интерпретациях \mathcal{I}, \mathcal{J}

Далее эрбрановские интерпретации будем отождествлять с подмножествами эрбрановского базиса

Теорема Эрбрана

Что ещё полезного можно извлечь из \mathcal{H} -интерпретаций?

Система дизъюнктов S противоречива



Для каждой \mathcal{H} -интерпретации \mathcal{I} найдутся дизъюнкт $D \in S$ и набор основных термов t_1, \dots, t_n , такие что

$$\mathcal{I} \not\models D[t_1, \dots, t_n]$$



Для каждой \mathcal{H} -интерпретации \mathcal{I} существует основной¹ пример² D' дизъюнкта $D \in S$, такой что

$$\mathcal{I} \not\models D'$$

¹ D' не содержит переменных

² $D' = D\theta$ для некоторой подстановки θ

Теорема Эрбрана

Рассмотрим такое множество дизъюнктов \mathcal{G}_S :

$D \in \mathcal{G}_S \iff D$ — основной пример какого-либо дизъюнкта из S , и существует \mathcal{H} -интерпретация \mathcal{I} , такая что $\mathcal{I} \not\models D$

Тогда

система дизъюнктов S противоречива

\Leftrightarrow

система дизъюнктов \mathcal{G}_S противоречива

Теорема Эрбрана

Теорема компактности Мальцева: $\Gamma \models \varphi \Leftrightarrow$ существует **конечное** подмножество Γ' множества Γ , такое что $\Gamma' \models \varphi$

Следствие: множество замкнутых формул Γ противоречиво \Leftrightarrow существует **конечное** противоречивое подмножество Γ' множества Γ

Применим это следствие к системе основных примеров \mathcal{G}_S :

множество \mathcal{G}_S противоречиво

\Leftrightarrow

существует **конечное** противоречивое подмножество \mathcal{G}' множества \mathcal{G}_S

Только что мы доказали **теорему Эрбрана**

Теорема Эрбрана

Система дизъюнктов противоречива



Существует конечное противоречивое множество основных примеров дизъюнктов этой системы

Основной пример дизъюнкта не содержит кванторов и предметных переменных

Значит, противоречивость конечной системы основных примеров — это противоречивость **конечной системы булевых формул**

Значит ли это, что (*неразрешимая*) проблема общезначимости формул логики предикатов сведена к (*NP-полной*) проблеме выполнимости булевых формул?

Нет: в теореме Эрбрана не говорится, как построить подходящую систему основных примеров дизъюнктов

Теорема Эрбрана

Система дизъюнктов противоречива



Существует конечное противоречивое множество основных примеров дизъюнктов этой системы

А зачем тогда нужна теорема Эрбрана?

- ▶ Далее будет показано существование успешного резолютивного вывода для произвольной конечной противоречивой системы основных примеров дизъюнктов, и
- ▶ на основании этого вывода будет построен успешный резолютивный вывод для **произвольной** противоречивой системе дизъюнктов

Так будет обосновываться **полнота** метода резолюций

Конец лекции 8