

# Математическая логика и логическое программирование

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

e-mail:

[valdus@yandex.ru](mailto:valdus@yandex.ru)

2016, весенний семестр

# Лекция 3

Логика предикатов

Синтаксис: термы и формулы

Семантика: интерпретации, отношение выполнимости

Выполнимые и общезначимые формулы

Модели

Логическое следствие

Проблема общезначимости формул

# Немного о названии

|

классическая  
логика  
предикатов  
первого порядка

# Немного о названии

||

логика  
предикатов  
первого порядка

# Немного о названии

III

логика  
предикатов

# Немного о названии

IV

логика

первого порядка

## Немного о названии

Будем использовать такое название:

логика  
предикатов

# Что такое предикат?

Предикат<sup>1</sup> (лат. *praedicatum* — сказанное, сказуемое):

понятие, определяющее предмет суждения (субъект)

Кто-то прогуливает лекцию  
(субъект) (предикат) (объект)

В более общем смысле:

- ▶ свойство, атрибут предмета, явления, события, ...
- ▶ отношение между явлениями, предметами, событиями, ...

---

<sup>1</sup> Ожегов, Шведова. Толковый словарь русского языка

# Что хорошего в логике предикатов?

Попробуем формализовать такое высказывание:

Если кто-то прогуливает лекции, то экзамен он не сдаст

# Что хорошего в логике предикатов?

Попробуем формализовать такое высказывание:

**Если** кто-то прогуливает лекции, **то** экзамен он **не сдаст**

*логика высказываний:*

Shirk → ¬Pass

# Что хорошего в логике предикатов?

Попробуем формализовать такое высказывание:

Если кто-то прогуливает лекции, то экзамен не сдаст его сосед

логика предикатов:

$$\forall x (\text{Shirk}(x) \rightarrow \neg \text{Pass}(\text{neighbour}(x)))$$

Логика предикатов изучает законы причинно-следственной зависимости между утверждениями, представленными в виде отношений

Для этого вводится формальный язык описания таких отношений, то есть определяются:

- ▶ алфавит
- ▶ синтаксис
- ▶ семантика

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$

Предметные константы

— это **имена предметов**

Функциональные символы

обозначают **операции**

над предметами

Предикатные символы

обозначают **отношения**

между предметами

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$$

Предметные константы

$$\text{Const} = \{c_1, c_2, \dots\}$$

Функциональные символы

$$\text{Func} = \{f_1^{(n_1)}, f_2^{(n_2)}, \dots\}$$

Предикатные символы

$$\text{Pred} = \{P_1^{(m_1)}, P_2^{(m_2)}, \dots\}$$

$n_i$  — местность функционального символа  $f_i$

$m_i$  — местность предикатного символа  $P_i$

запись местности будет опускаться

Тройка  $\langle \text{Const}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$  — сигнатура алфавита

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$$

Предметные константы

$$\text{Const} = \{c_1, c_2, \dots\}$$

Функциональные символы

$$\text{Func} = \{f_1^{(n_1)}, f_2^{(n_2)}, \dots\}$$

Предикатные символы

$$\text{Pred} = \{P_1^{(m_1)}, P_2^{(m_2)}, \dots\}$$

## Примеры

констант:

$$0, 1, \pi, \dots$$

функциональных символов:

$$+^{(2)}, .^{(2)}, \lim^{(3)}, \dots$$

предикатных символов:

$$<^{(2)}, =^{(2)}, \dots$$

# Алфавит

## II. Логические связи

Конъюнкция	(логическое И)	&
Дизъюнкция	(логическое ИЛИ)	∨
Отрицание	(логическое НЕ)	¬
Импликация	(логическое ЕСЛИ-ТО)	→

## III. Кванторы

Квантор всеобщности	("для каждого")	∀
Квантор существования	("хотя бы один")	∃

## IV. Знаки препинания

Скобки	(      )
Разделитель	,

# Синтаксис: термы

Терм — это:

$x$

$(x \in \text{Var})$

$c$

$(c \in \text{Const})$

$f(t_1, \dots, t_n)$

$(f^{(n)} \in \text{Func}; t_1, \dots, t_n — \text{термы})$

Term — множество всех термов в заданном алфавите

Пусть  $t$  — терм. Тогда:

$\text{Var}_t$  — множество всех переменных, входящих в терм  $t$

$t(x_1, \dots, x_n)$  — иная запись для  $t$ , если  $\text{Var}_t \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$

Терм  $t$  — основной, если  $\text{Var}_t = \emptyset$

# Синтаксис: термы

## Примеры термов

**z**  $(z \in \text{Var})$

**3**  $(3 \in \text{Const})$

**exp(3, z)**  $(\text{exp}^{(2)} \in \text{Func})$

**$\cdot(x, +(1, \text{exp}(3, z)))$**   $(\cdot^{(2)}, +^{(2)} \in \text{Func}; 1 \in \text{Const}; x \in \text{Var})$

**$x \cdot (1 + 3^z)$**  — инфиксная форма записи

**$1 \cdot (1 + 3^1)$**  — основной терм

# Синтаксис: формулы

Формула — это:

$P(t_1, \dots, t_m)$  (атомарная формула  
, или атом)  $(P^{(m)} \in \text{Pred},$   
 $t_1, \dots, t_m \in \text{Term})$

$(\varphi \& \psi)$   
 $(\varphi \vee \varphi)$   
 $(\varphi \rightarrow \varphi)$   
 $(\neg \varphi)$   
 $(\forall x \varphi)$   
 $(\exists x \varphi)$

} составная формула

$(\varphi, \varphi — \text{формулы},$   
 $x \in \text{Var})$

Form — множество всех формул в заданном алфавите

# Синтаксис: формулы

## Пояснение

$P(t_1, \dots, t_m)$  “предметы, описываемые термами  $t_1, \dots, t_m$   
находятся в отношении  $P$ ”

$(\varphi \& \psi)$  “ $\varphi$  и  $\psi$ ”

$(\varphi \vee \psi)$  “ $\varphi$  или  $\psi$ ”

$(\varphi \rightarrow \psi)$  “если  $\varphi$ , то  $\psi$ ”

$(\neg \varphi)$  “неверно, что  $\varphi$ ”

$(\forall x \varphi)$  “для любого предмета  $x$  верно  $\varphi$ ”

$(\exists x \varphi)$  “хотя бы для одного предмета  $x$  верно  $\varphi$ ”

# Синтаксис: формулы

## Примеры формул

$P(y, f(x, y))$   $(P^{(2)} \in \text{Pred},$

$f^{(2)} \in \text{Func}, x, y \in \text{Var})$

$(\neg P(y, f(x, y)))$

$(\forall x \neg P(y, f(x, y)))$

$((\forall x \neg P(y, f(x, y))) \rightarrow R(x))$   $(R^{(1)} \in \text{Pred})$

$(\exists y ((\forall x \neg P(y, f(x, y))) \rightarrow R(x)))$

# Синтаксис: формулы

Приоритет логических операций (в порядке убывания)

$\forall, \exists, \neg$   
 $\&$   
 $\vee$   
 $\rightarrow$

## Пример

Следующие формулы считаются одинаковыми:

$$(((\forall x (\neg P(x))) \& (\exists y R(x, y))) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y))))$$

$$((\forall x (\neg P(x))) \& (\exists y R(x, y))) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y)))$$

$$(\forall x (\neg P(x)) \& \exists y R(x, y)) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y)))$$

...

$$\forall x \neg P(x) \& \exists y R(x, y) \rightarrow \exists x (\neg P(x) \vee P(y))$$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

Область действия квантора  $\exists$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Переменная  $y$  связана квантором  $\exists$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Связанные вхождения этой переменной

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

Область действия квантора  $\forall$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Переменная  $x$  связана квантором  $\forall$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Связанное вхождение этой переменной

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Свободное вхождение переменной  $x$

# Синтаксис: формулы

Квантор связывает ту **переменную**, которая следует за ним

Вхождение **переменной** в область действия связывающего её квантора — **связанное вхождение**

Вхождение переменной, не являющееся связанным, — **свободное вхождение**

Переменная, имеющая свободное вхождение, — **свободная переменная** формулы

**Например**, в рассмотренной формуле

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(\textcolor{green}{x}))$$

свободной является только переменная **x**

# Синтаксис: формулы

Формально, множество  $\text{Var}_\varphi$  свободных переменных формулы  $\varphi$  определяется так:

- |  |  |
|--|--|
| если $\varphi = P(t_1, \dots, t_m)$ ,  | то $\text{Var}_\varphi = \bigcup_{1 \leq i \leq m} \text{Var}_{t_i}$ |
| если $\varphi = (\neg\psi)$ ,  | то $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi$                            |
| если $\varphi = (\psi \& \chi) / (\psi \vee \chi) / (\psi \rightarrow \chi)$ , | то $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi \cup \text{Var}_\chi$       |
| если $\varphi = (\forall x \psi) / (\exists x \psi)$ ,                         | то $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi \setminus \{x\}$            |

Пусть  $\varphi$  — формула. Тогда:

$\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — иная запись для  $\varphi$ , если  $\text{Var}_\varphi \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$

если  $\text{Var}_\varphi = \emptyset$ , то  $\varphi$  — замкнутая формула, или предложение

$CForm^1$  — множество всех замкнутых формул

в заданном алфавите

---

<sup>1</sup> Closed Formulae

# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$$\lim(x, s) =$$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

в алфавите с такой сигнатурой:

$0 \in \text{Const}$

$\text{ad}^{(2)} \in \text{Func}: \quad \text{ad}(x, y) = “|x - y|”$

$R^{(1)}, N^{(1)}, S^{(1)}, E^{(3)}, <^{(2)} \in \text{Pred}: \quad$

$R(x) = “x — действительное число”$

$N(x) = “x — натуральное число”$

$S(x) = “x — последовательность действительных чисел”$

$E(x, n, s) = “x — n-й член последовательности s”$

$<(x, y) = “x < y”$

# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$$\lim(x, s) =$$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

Ответ:

$$R(x) \& S(s) \& \forall \varepsilon (R(\varepsilon) \& (\mathbf{0} < \varepsilon) \rightarrow$$

$$\exists n (N(n) \& \forall m (N(m) \& (n < m) \rightarrow$$

$$\forall y (E(y, m, s) \rightarrow (\mathbf{ad}(x, y) < \varepsilon))))$$

# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$$\lim(x, s) =$$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

Ответ:

$$R(x) \& S(s) \& \forall \varepsilon (R(\varepsilon) \& (\mathbf{0} < \varepsilon) \rightarrow$$

$$\exists n (N(n) \& \forall m (N(m) \& (n < m) \rightarrow$$

$$\exists y (E(y, m, s) \& (\text{ad}(x, y) < \varepsilon))))$$

А так тоже верно?

# Семантика: интерпретации

А как в логике предикатов выглядит интерпретация —  
“мир, в котором живёт формула”?

Для этого надо описать

- ▶ предметы, населяющие мир
- ▶ операции<sup>1</sup> над предметами
- ▶ отношения<sup>2</sup>, связывающие предметы

Таким образом, в основе **интерпретаций** логики предикатов лежат **алгебраические системы**<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> это смысл **термов**

<sup>2</sup> это смысл **атомов**

<sup>3</sup> не следует пугаться этого термина; это и есть совокупность  
“предметы + операции + отношения”

# Семантика: интерпретации

Интерпретация (сигнатуры  $\langle \text{Const}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ ) — это система  $\langle D, \overline{\text{Const}}, \overline{\text{Func}}, \overline{\text{Pred}} \rangle$ , где:

- ▶  $D$  — непустое множество  
*(область интерпретации; предметная область; универсум)*
- ▶  $\overline{\text{Const}} : \text{Const} \rightarrow D$  — оценка констант
  - ▶  $\bar{c} = \overline{\text{Const}}(c)$  — предмет, сопоставленный константе  $c$
- ▶  $\overline{\text{Func}} : \text{Func} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} (D^n \rightarrow D)$  — оценка функциональных символов
  - ▶  $\bar{f} = \overline{\text{Func}}(f) : D^n \rightarrow D$  — функция,  
сопоставленная символу  $f^{(n)}$
- ▶  $\overline{\text{Pred}} : \text{Pred} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} (D^n \rightarrow \{t, f\})$  — оценка предикатных символов
  - ▶  $\bar{P} = \overline{\text{Pred}}(P) : D^n \rightarrow \{t, f\}$  — предикат,  
сопоставленный символу  $P^{(n)}$

# Семантика: интерпретации

## Пример

Сигнатура:  $\text{Const} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ ,  $\text{Func} = \{\mathbf{f}^{(1)}\}$ ,  $\text{Pred} = \{\mathbf{P}^{(1)}, \mathbf{R}^{(2)}\}$

Интерпретация:

предметная область:  $D = \{d_1, d_2, d_3\}$

оценка констант:  $\overline{\mathbf{c}_1} = d_1$ ,  $\overline{\mathbf{c}_2} = d_2$

оценка функциональных и предикатных символов:

$\overline{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$

x	$\overline{\mathbf{f}}(\mathbf{x})$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\overline{\mathbf{P}}(\mathbf{x})$

x	$\overline{\mathbf{P}}(\mathbf{x})$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\overline{\mathbf{R}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

# Семантика: интерпретации

## Значение терма

Пусть  $t(x_1, \dots, x_n)$  — терм,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Значение  $t(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  терма  $t$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- ▶ терм-переменная:

$$x_i[d_1, \dots, d_n] = d_i$$

- ▶ терм-константа:

$$c[d_1, \dots, d_n] = \bar{c}$$

- ▶ иначе:

$$f(t_1, \dots, t_k)[d_1, \dots, d_n] = \bar{f}(t_1[d_1, \dots, d_n], \dots, t_k[d_1, \dots, d_n])$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- атомарная формула:

$$\begin{aligned}\mathcal{I} \models P(t_1, \dots, t_k)[d_1, \dots, d_n] \\ \Leftrightarrow \\ \bar{P}(t_1[d_1, \dots, d_n], \dots, t_k[d_1, \dots, d_n]) = t\end{aligned}$$

# Семантика: выполнимость

## Отношение выполнимости формул $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- ▶ конъюнкция:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \& \psi)[d_1, \dots, d_n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \models \varphi[d_1, \dots, d_n]$$

И

$$\mathcal{I} \models \psi[d_1, \dots, d_n]$$

# Семантика: выполнимость

## Отношение выполнимости формул $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- дизъюнкция:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \vee \psi)[d_1, \dots, d_n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \models \varphi[d_1, \dots, d_n]$$

ИЛИ

$$\mathcal{I} \models \psi[d_1, \dots, d_n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- отрицание:

$$\mathcal{I} \models (\neg\varphi)[d_1, \dots, d_n] \Leftrightarrow \mathcal{I} \not\models \varphi[d_1, \dots, d_n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- импликация:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \rightarrow \psi)[d_1, \dots, d_n] \Leftrightarrow$$

$$\mathcal{I} \not\models \varphi[d_1, \dots, d_n]$$

ИЛИ

$$\mathcal{I} \models \psi[d_1, \dots, d_n]$$

# Семантика: выполнимость

## Отношение выполнимости формул $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- квантор всеобщности:

$$\mathcal{I} \models (\forall x_0 \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n))[d_1, \dots, d_n] \\ \Leftrightarrow$$

для любого предмета  $d_0$  из области интерпретации верно  
 $\mathcal{I} \models \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n)[d_0, \dots, d_n]$

# Семантика: выполнимость

## Отношение выполнимости формул $\models$

Пусть  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- квантор существования:

$$\mathcal{I} \models (\exists x_0 \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n))[d_1, \dots, d_n]$$

$\Leftrightarrow$

хотя бы для одного предмета  $d_0$

из области интерпретации верно

$$\mathcal{I} \models \varphi(x_0, x_1, \dots, x_n)[d_0, \dots, d_n]$$

# Семантика: выполнимость

## Пример

Рассмотрим интерпретации такого вида:

предметная область — квадраты и круги белого и чёрного цвета, расположенные на плоскости

сигнатура состоит из пяти предикатных символов, отвечающих следующим свойствам:

$C(x)$ : “ $x$  — круг”

$S(x)$ : “ $x$  — квадрат”

$B(x)$ : “ $x$  — чёрный предмет”

$W(x)$ : “ $x$  — белый предмет”

$U(x, y)$ : “предмет  $x$  лежит под предметом  $y$ ”

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :



и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall \textcolor{green}{x} (\text{W}(\textcolor{green}{x}) \& \text{S}(\textcolor{green}{x}) \rightarrow \exists \textcolor{teal}{y} (\text{B}(\textcolor{teal}{y}) \& \text{C}(\textcolor{teal}{y}) \& \text{U}(\textcolor{green}{x}, \textcolor{teal}{y})))$$

Как прочитывается эта формула?

Для каждого предмета  $x$ : если он является белым и является квадратом, то существует предмет  $y$ , который является чёрным, и является кругом, и предмет  $x$  лежит под предметом  $y$

Проще говоря,

Каждый белый квадрат лежит под каким-то чёрным кругом

Как строго убедиться, что это утверждение верно?

Проверить соотношение  $\mathcal{I} \models \varphi$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

$d_1$      $d_2$

$d_3$      $d_4$

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall \mathbf{x} (W(\mathbf{x}) \& S(\mathbf{x}) \rightarrow \exists \mathbf{y} (B(\mathbf{y}) \& C(\mathbf{y}) \& U(\mathbf{x}, \mathbf{y})))$$

Переберём все предметы, подставляя их на место  $\mathbf{x}$

1.  $\mathbf{x} \leftarrow d_1$ :

- ▶  $\mathcal{I} \not\models W(\mathbf{x})[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \not\models (W(\mathbf{x}) \& S(\mathbf{x}))[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (W(\mathbf{x}) \& S(\mathbf{x}) \rightarrow \exists \mathbf{y} (B(\mathbf{y}) \& C(\mathbf{y}) \& U(\mathbf{x}, \mathbf{y}))) [d_1]$

2.  $\mathbf{x} \leftarrow d_2$ :

- ▶  $\mathcal{I} \not\models W(\mathbf{x})[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \not\models (W(\mathbf{x}) \& S(\mathbf{x}))[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models ((W(\mathbf{x}) \& S(\mathbf{x})) \rightarrow \exists \mathbf{y} (B(\mathbf{y}) \& C(\mathbf{y}) \& U(\mathbf{x}, \mathbf{y}))) [d_2]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :



и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall \mathbf{x} (\mathbf{W}(\mathbf{x}) \& \mathbf{S}(\mathbf{x}) \rightarrow \exists \mathbf{y} (\mathbf{B}(\mathbf{y}) \& \mathbf{C}(\mathbf{y}) \& \mathbf{U}(\mathbf{x}, \mathbf{y})))$$

Переберём все предметы, подставляя их на место  $\mathbf{x}$

3.  $\mathbf{x} \leftarrow d_3$ :

- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{B}(y)[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{C}(y)[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{U}(x, y)[y/d_1, x/d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y))[y/d_1, x/d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\exists y (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y)))[d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models ((\mathbf{W}(x) \& \mathbf{S}(x)) \rightarrow \exists y (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y)))[d_3]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

$d_1$   $d_2$

$d_3$   $d_4$

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall \mathbf{x} (\mathbf{W}(\mathbf{x}) \& \mathbf{S}(\mathbf{x}) \rightarrow \exists \mathbf{y} (\mathbf{B}(\mathbf{y}) \& \mathbf{C}(\mathbf{y}) \& \mathbf{U}(\mathbf{x}, \mathbf{y})))$$

Переберём все предметы, подставляя их на место  $\mathbf{x}$

4.  $\mathbf{x} \leftarrow d_4$ :

- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{B}(y)[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{C}(y)[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models \mathbf{U}(x, y)[y/d_2, x/d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y))[y/d_2, x/d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\exists y (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y)))[d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models ((\mathbf{W}(x) \& \mathbf{S}(x)) \rightarrow \exists y (\mathbf{B}(y) \& \mathbf{C}(y) \& \mathbf{U}(x, y)))[d_4]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

$d_1$      $d_2$

$d_3$      $d_4$

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

Итого:

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_1]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_4]$$

А значит,

$$\mathcal{I} \models \forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

# Семантика: выполнимость

## Ещё один пример

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

сигнатура:  $\text{Const} = \emptyset$ ,  $\text{Func} = \{\bar{f}^{(1)}\}$ ,  $\text{Pred} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$

предметная область:  $D = \{d_1, d_2, d_3\}$

оценка функциональных и предикатных символов:

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\bar{R}(x, y)$				
x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

Проверим соотношение  $\mathcal{I} \models \varphi$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$

x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$

x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\bar{R}(x, y)$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$

x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$

x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\bar{R}(x, y)$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models R(x, y)[y/d_1, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models R(x, y)[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$

x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$

x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\bar{R}(x, y)$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_2]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_2]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	$t$
$d_2$	$f$
$d_3$	$t$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	$t$	$t$	$f$	
$d_2$	$t$	$f$	$t$	
$d_3$	$f$	$t$	$t$	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$

x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$

x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

$\bar{R}(x, y)$

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$	
x	$\bar{f}(x)$
$d_1$	$d_2$
$d_2$	$d_3$
$d_3$	$d_1$

$\bar{P}(x)$	
x	$\bar{P}(x)$
$d_1$	t
$d_2$	f
$d_3$	t

x	y	$d_1$	$d_2$	$d_3$
$d_1$	t	t	f	
$d_2$	t	f	t	
$d_3$	f	t	t	

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

Значит,

$$\mathcal{I} \not\models \forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

# Выполнимые и общезначимые формулы

Формула  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  выполнима в интерпретации  $\mathcal{I}$ , если существует набор предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации  $\mathcal{I}$ , такой что  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$

Формула  $\varphi(x_1, \dots, x_n)$  истинна в интерпретации  $\mathcal{I}$ , если для любого набора предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации  $\mathcal{I}$  верно  $\mathcal{I} \models \varphi(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$

Формула  $\varphi$  выполнима, если существует интерпретация, в которой она выполнима

Формула  $\varphi$  общезначима (или тождественно истинна), если она истинна в любой интерпретации

Формула  $\varphi$  противоречива (или невыполнима), если она не является выполнимой

# Выполнимые и общезначимые формулы

## Пример

$$\varphi : \forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x) \quad \psi : \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x) \quad \chi : \forall x P(x) \rightarrow \forall x \neg P(x)$$

Интерпретация  $\mathcal{I}_1$ :  $D = \{d\}$ ,  $\overline{P}(d) = t$

$$\mathcal{I}_1 \models \varphi \qquad \mathcal{I}_1 \models \psi \qquad \mathcal{I}_1 \not\models \chi$$

Интерпретация  $\mathcal{I}_2$ :  $D = \{d_1, d_2\}$ ,  $\overline{P}(d_1) = t$ ,  $\overline{P}(d_2) = f$

$$\mathcal{I}_2 \models \varphi \qquad \mathcal{I}_2 \not\models \psi \qquad \mathcal{I}_2 \not\models \chi$$

Что мы только что доказали?

Формулы  $\varphi$ ,  $\psi$  выполнимы; формулы  $\psi$ ,  $\chi$  необщезначимы

**Факт:** формула  $\varphi$  общезначима, а формула  $\chi$  невыполнима

Но почему? И как можно это обосновать?

# Выполнимые и общезначимые формулы

Выполнимые необщезначимые формулы — это логические формы, которые служат для представления знаний, несущих в себе “нетривиальную” (“полезную”) информацию

Общезначимые формулы — это банальности, тавтологии, знания, не несущие в себе никакой “полезной” информации

При этом общезначимые формулы в логике считаются чрезвычайно важными

Почему?

Этот вопрос (*в некоторой степени*) разъяснится дальше<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> в теореме о логическом следствии

# Модели

Пусть  $F$  — множество предложений ( $\varphi$  — предложение),  
и  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Если каждая формула из  $F$  (формула  $\varphi$ ) выполнима в  $\mathcal{I}$ ,  
то  $\mathcal{I}$  — модель для  $F$  (для  $\varphi$ )

Как можно понимать модель?

Это мир, устройство которого адекватно всем предложениям  
из  $F$

Пища для размышлений

- ▶ Какие интерпретации являются моделью для пустого множества формул?
  - ▶ Ответ: любые. А почему?
- ▶ Существуют ли множества формул, не имеющие модели?
  - ▶ Ответ: да. А какие?

# Модели

## Пример

Снова рассмотрим интерпретации с квадратами и кругами белого и чёрного цвета на плоскости:

$C(x)$ : “ $x$  — круг”

$S(x)$ : “ $x$  — квадрат”

$B(x)$ : “ $x$  — чёрный предмет”

$W(x)$ : “ $x$  — белый предмет”

$U(x, y)$ : “предмет  $x$  лежит под предметом  $y$ ”

Рассмотрим такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y \& U(x, y))))$$

“любой белый квадрат лежит под каким-то чёрным кругом”

и такие интерпретации:

$$\mathcal{I}_1: \begin{array}{cc} \bullet & \bullet \\ \square & \square \end{array}$$

$$\mathcal{I}_2: \begin{array}{c} \bullet \\ \square \end{array}$$

Тогда  $\mathcal{I}_1$  является моделью для  $\varphi$ , а  $\mathcal{I}_2$  не является

# Логическое следствие

Пусть  $F$  — множество предложений, и  $\varphi$  — предложение

Тогда формула  $\varphi$  — логическое следствие множества  $F$ , если любая модель для множества  $F$  является моделью для  $\varphi$ , то есть если для любой интерпретации  $\mathcal{I}$  верно:

$$\mathcal{I} \models F \quad \Rightarrow \quad \mathcal{I} \models \varphi$$

Как можно понимать логическое следствие  $\varphi$  множества  $F$ ?

Если  $F$  — имеющиеся у нас “базовые” знания, то  $\varphi$  — необходимо следующее из них “производное” знание

Одна из главных задач (и характерное проявление) интеллектуальной деятельности — это извлечение логических следствий из имеющихся баз знаний

Эта задача возникает в огромном числе областей “разумной деятельности”: экспертные системы, (автоматическое и ручное) доказательство теорем, формальный анализ программ, ..., ...

# Логическое следствие

Пусть  $F$  — множество предложений, и  $\varphi$  — предложение

Запись  $F \models \varphi$  используется для обозначения того, что  $\varphi$  — логическое следствие множества  $F$

А какие формулы являются логическими следствиями пустого множества формул?

Общезначимые, и поэтому общезначимость формулы  $\varphi$  обозначается так:

$$\models \varphi$$

А как выглядят логические следствия непустых множеств предложений?

# Логическое следствие

## Пример

Покажем, что представляют собой логические следствия, на простом, но показательном примере

Известно, что:

- ▶ Даша любит Сашу,
- ▶ а Саша любит пиво,
- ▶ а Паша любит пиво и всех тех, кто любит то же, что и он

**Любит ли кто-нибудь Дашу?**

Попробуем переформулировать эту задачу на языке логики предикатов

Начнём с сигнатуры алфавита; в неё войдут:

- ▶ константы **Даша, Саша, Паша, пиво**
- ▶ предикатный символ  $L^{(2)}$ :  $L(x, y) = \text{"икс любит игрека"}$

# Логическое следствие

## Пример

Условия задачи переписываются так:

- ▶ Даша любит Сашу:  $\varphi_1 : L(\text{Даша}, \text{Саша})$
- ▶ Саша любит пиво:  $\varphi_2 : L(\text{Саша}, \text{пиво})$
- ▶ Паша любит пиво и всех тех, кто любит то же, что и он:  
 $\varphi_3 : L(\text{Паша}, \text{пиво})$   
 $\varphi_4 : \forall x (\exists y (L(\text{Паша}, y) \& L(x, y)) \rightarrow L(\text{Паша}, x))$
- ▶ Любит ли кто-нибудь дашу?:  $\varphi_0 : \exists x L(x, \text{Даша})$

Сама задача тогда записывается так:

проверить соотношение  $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\} \models \varphi_0$

А как это проверить? И причём здесь общезначимость формул?

# Логическое следствие

Теорема о логическом следствии

Пусть  $F = \{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$  — конечное множество предложений, и  $\varphi$  — предложение. Тогда

$$F \models \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \models \psi_1 \& \psi_2 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Доказательство. ( $\Rightarrow$ ):

Рассмотрим произвольную интерпретацию  $\mathcal{I}$

Если  $\mathcal{I} \not\models F$ , то  $\mathcal{I} \not\models \psi_1 \& \dots \& \psi_n$ , а значит,

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Пусть теперь  $\mathcal{I} \models F$

Так как  $F \models \varphi$ , имеем:  $\mathcal{I} \models \varphi$  — а значит, снова верно

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Итого, для произвольной интерпретации  $\mathcal{I}$  верно:

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Но это и означает общезначимость формулы  $\psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$

# Логическое следствие

## Теорема о логическом следствии

Пусть  $F = \{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$  — конечное множество предложений, и  $\varphi$  — предложение. Тогда

$$F \models \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \models \psi_1 \& \psi_2 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

### Доказательство. ( $\Leftarrow$ ):

Рассмотрим произвольную модель  $\mathcal{I}$  для множества  $F$ :

$$\mathcal{I} \models \psi_1, \dots, \mathcal{I} \models \psi_n$$

Тогда  $\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n$

По рассматриваемому случаю формула  $\psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$  общезначима, а значит, верно:  $\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$

Это возможно только в том случае, если верно:  $\mathcal{I} \models \varphi$

Таким образом, произвольная модель  $\mathcal{I}$  для множества  $F$  является моделью для  $\varphi$



# Проблема общезначимости формул

Что же представляют собой общезначимые формулы?

Это способы преобразования знаний из одной формы в другую, учитывающие причинно-следственные связи, которые можно описать с помощью логики предикатов

Чтобы уметь извлекать новые знания ( $\varphi$ ) из имеющихся ( $F = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ ), нужно понимать, как устроены эти способы преобразования знаний

Более строго, проверка логического следствия  $F \models \varphi$  сводится к проверке общезначимости формулы:

$$\models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Это и означает важность проблемы общезначимости формул:

для заданной формулы  $\varphi$   
проверить её общезначимость:  
 $\models \varphi?$

Конец лекции 3