Лекция 2. Алгоритм распознавания полноты в P_k. Теорема Кузнецова. Замкнутые классы. Классы функций, сохраняющих множество. Классы функций, сохраняющих разбиение. Предполные классы.

Лектор — Селезнева Светлана Николаевна
selezn@cs.msu.ru

факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова

Лекции на сайте https://mk.cs.msu.ru

Алгоритм распознавания полноты

Теорема 1 (о существовании алгоритма, распознающего полноту в P_k). *Пусть $k \geqslant 3$. Существует детерминированный алгоритм, которому на вход подается* **конечное** *множество функций*

$$A = \{f_1, \ldots, f_t\} \subseteq P_k$$

и который через конечное число шагов останавливается и выдает ответ «да», если система A — полна, и выдает ответ «нет», если система A не является полной.

Доказательство.
Т. к. можно добавлять несущественные переменные, будем считать, что все функции $f_j \in A$ зависят от одних и тех же переменных $x_1, \ldots, x_n$.

Алгоритм распознавания полноты

Доказательство. По индукции построим последовательность множеств

$$N_0 \subseteq N_1 \subseteq N_2 \subseteq \ldots \subseteq P_k^{(2)}.$$

Базис индукции. $N_0 = \{x_1, x_2\}$.

Индуктивные переход. Пусть множество $N_r \subseteq P_k^{(2)}$ уже построено. Для каждой функции $f_j \in A$, $j = 1, \ldots, t$, рассмотрим все функции, которые получаются подстановкой вместо ее переменных функций из множества N_r. Положим

$$N_{r+1} = N_r \cup \{f_j(g_1(x_1, x_2), \ldots, g_n(x_1, x_2)) \mid g_i \in N_r\},$$

где $i = 1, \ldots, n$, $j = 1, \ldots, t$.

Например, множество N_1 содержит в точности все функции, которые можно получить, если вместо переменных функций $f_j \in A$ подставлять только x_1 и x_2.

Алгоритм распознавания полноты

Доказательство. Т. к. $N_r \subseteq P_k^{(2)}$ для всех r и $|P_k^{(2)}| = k^{k^2}$ (т. е. $|P_k^{(2)}|$ — конечное число), найдется такое r^*, что

$$N_0 \subset N_1 \subset \ldots \subset N_{r^*-1} \subset N_{r^*} = N_{r^*+1} = \ldots$$

Пусть алгоритм останавливается, когда построено такое множество N_{r^*}, что $N_{r^*} = N_{r^*+1}$.
Тогда
1) если $V_k(x_1, x_2) \in N_{r^*}$, то ответ «да», т. к. система $\{V_k\}$ — полна;
2) если $V_k(x_1, x_2) \notin N_{r^*}$, то ответ «нет», т. к. замыкание $[A]$ не содержит даже все функции от двух переменных.

$\square$

Полнота в P_k

А рассматривался ли алгоритм распознавания полноты в P_2? Да, он основан на теореме Поста и заключается в проверке свойств сохранения констант, линейности, самодвойственности и монотонности для функций из исходного множества $A \subseteq P_2$.

Можно ли в P_k при $k \geqslant 3$ доказать теорему, аналогичную теореме Поста в P_2? Да, это теорема Кузнецова.

Теорема 2 (А.В. Кузнецова о функциональной полноте). *Пусть $k \geqslant 3$. Существует такое* **конечное** *семейство замкнутых и не содержащихся друг в друге классов в P_k*

$$M_1, \ldots, M_{s(k)},$$

что для любого множества $A \subseteq P_k$ система A — полна в P_k тогда и только тогда, когда она не содержится ни в одном из классов $M_1, \ldots, M_{s(k)}$.

Функция, сохраняющая множество

Пусть $E \subseteq E_k$. Функция $f(x_1, \ldots, x_n) \in P_k$ **сохраняет множество** E, если для всех $a_1, \ldots, a_n \in E$ верно $f(a_1, \ldots, a_n) \in E$.

Множество функций из P_k, сохраняющих множество E, обозначим $T_k(E)$.

Класс функций, сохраняющих множество

Теорема 3. *Пусть $k \geqslant 2$. Для каждого множества $E \subseteq E_k$ класс $T_k(E)$ замкнут.*

Доказательство. Пусть $E \subseteq E_k$. Заметим, что $x \in T_k(E)$. Пусть $f_0(y_1, \ldots, y_m) \in T_k(E)$ и $f_i(x_1, \ldots, x_n) \in T_k(E)$, где $i = 1, \ldots, m$.

Рассмотрим функцию

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f_0(f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)).$$

Тогда если $a_1, \ldots, a_n \in E$, то

$$\begin{aligned} f(a_1, \ldots, a_n) &= f_0(f_1(a_1, \ldots, a_n), \ldots, f_m(a_1, \ldots, a_n)) = \\ &= f_0(b_1, \ldots, b_m) \in E, \end{aligned}$$

т. к. $b_1, \ldots, b_m \in E$. $\square$

Классы функций, сохраняющих множество

Теорема 4. *Пусть $k \geqslant 2$ и $E \subseteq E_k$. Равенство $T_k(E) = P_k$ верно, если и только если $E = \emptyset$ или $E = E_k$.*

Доказательство.
1) Если $E = \emptyset$, то $T_k(E) = P_k$, т. к. никаких условий нет.
2) Если $E = E_k$, то $T_k(E) = P_k$, т. к. для всех функций условие выполнено.
3) Если $E \neq \emptyset$ и $E \neq E_k$, то пусть $a \in E$ и $b \in E_k \setminus E$. Рассмотрим такую функцию $f(x) \in P_k$, что $f(a) = b$. Тогда $f(x) \notin T_k(E)$.

$\square$

Если $k = 2$, то $T_2(\{0\}) = T_0$ и $T_2(\{1\}) = T_1$ — классы, сохраняющие константу ноль и константу один соответственно.

Неполнота системы $\{\sim x, \max(x, y)\}$ в P_k при $k \geqslant 3$

Пример. Докажем, что система $A = \{\sim x, \max(x, y)\}$ не является полной в P_k при $k \geqslant 3$.

Рассмотрим $E = \{0, k-1\} \subseteq E_k$. Заметим, что $E \neq E_k$ при $k \geqslant 3$. Кроме того,

$$\sim 0 = k-1, \ \sim (k-1) = 0,$$
$$\max(a, b) \in \{0, k-1\} \text{ при } a, b \in \{0, k-1\}.$$

Значит, $A \subseteq T_k(E)$. По теоремам 3 и 4 получаем:

$$[A] \subseteq [T_k(E)] = T_k(E) \neq P_k.$$

Т. е. система $\{\sim x, \max(x, y)\}$ не полна в P_k при $k \geqslant 3$.

При $k = 2$ система $\{\sim x = \bar{x}, \max(x, y) = x \vee y\}$ — полна.

Разбиение множества

Семейство $D = \{D_1, \ldots, D_s\}$ называется **разбиением** множества E_k, если

1) $D_i \neq \emptyset$ при $i = 1, \ldots, s$;
2) $D_i \cap D_j = \emptyset$ при $i \neq j$;
3) $\bigcup\limits_{i=1}^{s} D_i = E_k$.

Функция, сохраняющая разбиение

Пусть $D = \{D_1, \ldots, D_s\}$ — разбиение множества E_k. Элементы $a, b \in E_k$ называются **эквивалентными** по разбиению D, если найдется такое подмножество $D_i \in D$, что $a, b \in D_i$. Обозначение: $a \sim_D b$.

Наборы $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \beta = (\beta_1, \ldots, \beta_n) \in E_k^n$ называются **эквивалентными** по разбиению D, если $\alpha_i \sim_D \beta_i$ для всех $i = 1, \ldots, n$. Обозначение: $\alpha \sim_D \beta$.

Функция $f(x_1, \ldots, x_n) \in P_k$ **сохраняет разбиение** D, если для любых наборов $\alpha, \beta \in E_k^n$ из $\alpha \sim_D \beta$ следует $f(\alpha) \sim_D f(\beta)$.

Множество функций из P_k, сохраняющих разбиение D, обозначим $U_k(D)$.

Класс функций, сохраняющих разбиение

Теорема 5. *Пусть $k \geqslant 2$. Для каждого разбиения D класс $U_k(D)$ замкнут.*

Доказательство. Пусть D — разбиение множества E_k.
Заметим, что $x \in U_k(D)$.
Пусть $f_0(y_1, \ldots, y_m) \in U_k(D)$ и $f_i(x_1, \ldots, x_n) \in U_k(D)$, где $i = 1, \ldots, m$.
Рассмотрим функцию

$$f(x_1, \ldots, x_n) = f_0(f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n)).$$

Тогда если $\alpha, \beta \in E_k^n$ и $\alpha \sim_D \beta$, то

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= f_0(f_1(\alpha), \ldots, f_m(\alpha)) = f_0(\gamma), \\ f(\beta) &= f_0(f_1(\beta), \ldots, f_m(\beta)) = f_0(\delta), \end{aligned}$$

и $f(\alpha) \sim_D f(\beta)$, т. к. $\gamma \sim_D \delta$. $\square$

Классы функций, сохраняющих разбиение

Теорема 6. *Пусть $k \geqslant 2$ и $D = \{D_1, \ldots, D_s\}$ — разбиение множества E_k. Равенство $U_k(D) = P_k$ верно, если и только если $s = 1$ или $s = k$.*

Доказательство.
1) Если $s = 1$, то $U_k(D) = P_k$, т. к. все элементы E_k эквивалентны по разбиению.
2) Если $s = k$, то $U_k(D) = P_k$, т. к. эквивалентность по разбиению обозначает равенство элементов E_k.
3) Если $1 < s < k$, то найдется подмножество $D_i \in D$, в котором не менее двух элементов, пусть $a, b \in D_i$, $a \neq b$, и найдется еще хотя бы одно подмножество $D_j \in D$, $i \neq j$, пусть $c \in D_j$. Рассмотрим такую функцию $g(x) \in P_k$, что $g(a) = a$, $g(b) = c$. Тогда $g(x) \notin U_k(D)$.

$\square$

В P_2 нет не совпадающих с ним классов, сохраняющих разбиение.

Неполнота одной системы в P_k при $k \geqslant 3$

Пример. Докажем, что система

$$A = \{0, 1, \ldots, k-1, j_0(x), j_1(x), \ldots, j_{k-1}(x), \max(x, y), \min(x, y)\}$$

не является полной в P_k при $k \geqslant 3$.

Рассмотрим $D = \{D_1, D_2\}$, где $D_1 = \{0, 1\}$, $D_2 = \{2, \ldots, k-1\}$, при этом $s = 2$. Заметим, что $1 < s < k$ при $k \geqslant 3$.
Каждая константа, $j_i(x)$, $i \in E_k$, $\max(x, y)$, $\min(x, y)$ сохраняют разбиение D. Значит, $A \subseteq U_k(D)$. По теоремам 5 и 6 получаем:

$$[A] \subseteq [U_k(D)] = U_k(D) \neq P_k.$$

Т. е. система A не полна в P_k при $k \geqslant 3$.

При $k = 2$ система

$$\{0, 1, j_0(x) = \bar{x}, j_1(x) = x, \max(x, y) = x \vee y, \min(x, y) = xy\} -$$

полна.

Полнота некоторой системы в P_k при $k \geqslant 3$

Пример. Докажите, что система

$$A = \{0, 1, \ldots, k-1, J_0(x), J_1(x), \ldots, J_{k-1}(x), x+y, x \cdot y\} -$$

полна в P_k при всех $k \geqslant 3$.

Предполные классы

Пусть $A \subseteq P_k$, $k \geqslant 2$. Множество A называется **предполным** классом в P_k, если
1) $[A] \neq P_k$;
2) для любой функции $f \in P_k \setminus A$ верно $[A \cup \{f\}] = P_k$.

Любой предполный класс является замкнутым классом.
В P_2 пять предполных классов: T_0, T_1, L, S, M.
В P_k каждый из классов $M_1, \ldots, M_{s(k)}$ в теореме Кузнецова является предполным.

Для каждого $k \geqslant 2$ классы сохранения множества $T_k(E)$ и сохранения разбиения $U_k(D)$, если они не совпадают с P_k, являются предполными в P_k.
Но это **не все** предполные классы в P_k.

Задачи

1. При каждом $k \geqslant 3$ доказать неполноту в P_k множества $A \subseteq P_k$, подобрав подходящий класс $T_k(E)$ или $U_k(D)$, если:

1) $A = \{\sim x, J_0(x), x \cdot y^2\}$; 2) $A = \{\sim x, \max(x, y)\}$;
3) $A = \{2, \max(x, y), x \dot{-} y\}$; 4) $A = \{1, 2, \max(x, \bar{y})\}$.

2. При каждом $k \geqslant 3$ доказать полноту в P_k множества $A \subseteq P_k$ сведением его к заведомо полной системе (системе 1-й или 2-й формы или системе Поста), если

1) $A = \{k - 1, x \dot{-} y, x + y\}$; 2) $A = \{k - 2, x + 1, x \dot{-} y\}$;
3) $A = \{J_0(x), x + y, x \cdot y\}$; 4) $A = \{j_0(x), x + y, \max(x, y)\}$.

Задачи

3. При каждом $k \geqslant 3$ исследовать на полноту в P_k множество $A \subseteq P_k$, если

1) $A = \{k-1, x+2, \max(x,y)\}$; 2) $A = \{1, 2, \overline{x \dot{-} y}\}$;
3) $A = \{2 \dot{-} x, x \cdot y, \max(x,y)\}$; 4) $A = \{k-2, 2x+y, x \dot{-} y\}$.

4. Доказать, что система $A \subseteq P_k$ полна в P_k тогда и только тогда, когда k — простое число, если

1) $A = \{1, x+y+x \cdot z\}$; 2) $A = \{x-1, x+y, x^2 \cdot y\}$;
3) $A = \{k-2, x+2y, x \cdot y^2\}$; 4) $A = \{\sim x, x-y, x^2 \cdot y\}$.