

Математическая логика и логическое программирование

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы
→ Математическая логика и логическое программирование (3-й поток)

Блок 21

Алгоритм унификации атомарных формул

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич
E-mail:
valdus@yandex.ru

Напоминание: задача унификации

Для заданных выражений E_1, E_2 логики предикатов
выяснить, унифицируемы ли эти выражения,
и если это так, то вычислить
множество унификаторов, полное в $\Upsilon(E_1, E_2)$

Чтобы освоить метод резолюций,
достаточно научиться решать эту задачу для произвольной пары атомов

Переход от атомов к системам уравнений

Утверждение

Ни одна пара атомов $P(t_1, \dots, t_k), Q(s_1, \dots, s_m)$ с различными предикатными символами $P^{(k)}, Q^{(m)}$ не унифицируема

Доказательство

Пусть $P(\tilde{t}^k)\theta = P(\tilde{t'}^k)$ и $Q(\tilde{s}^m)\theta = Q(\tilde{s'}^m)$

Т.к. $P \neq Q$, верно и $P(\tilde{t'}^k) \neq Q(\tilde{s'}^m)$ ▼

Далее рассматривается только унификация атомов, содержащих одинаковые предикатные символы

Переход от атомов к системам уравнений

Унификация атомов $P(t_1, \dots, t_k), P(s_1, \dots, s_k)$

\Leftrightarrow

Вычисление подстановки θ , такой что $t_1\theta = s_1\theta, \dots, t_k\theta = s_k\theta$

\Leftrightarrow

Вычисление подстановки θ , такой что левая и правая части каждого уравнения в системе \mathcal{E} вида

$$\begin{cases} t_1 = s_1 \\ \dots \\ t_k = s_k \end{cases}$$

становятся посимвольно одинаковыми при применении θ

\Leftrightarrow

Вычисление решения системы уравнений \mathcal{E}

в свободной¹ алгебре термов²

¹ Значение терма — это сам терм,

то есть термы равны, если они посимвольно совпадают

² Операция композиции — это подстановка терма на место переменной

Системы уравнений над термами

Знак равенства в системах уравнений будем записывать так: \equiv — чтобы отличать такое равенство от посимвольного совпадения выражений

Системой уравнений (в свободной алгебре термов) будем называть запись \mathcal{E} вида

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = s_1 \\ \dots \\ t_k = s_k \end{array} \right.,$$

где $t_1, \dots, t_k, s_1, \dots, s_k$ — термы

Подстановка θ — **унификатор (решение)** системы \mathcal{E} , если для каждого i , $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, верно $t_i\theta = s_i\theta$

$U(\mathcal{E})$ — множество всех унификаторов системы уравнений \mathcal{E}

Система уравнений \mathcal{E} **унифицируема (имеет решение)**, если $U(\mathcal{E}) \neq \emptyset$

НОУ(\mathcal{E}) — множество всех **наиболее общих** унификаторов системы уравнений \mathcal{E}

Системы уравнений над термами

Пример

$$\mathcal{E} = \begin{cases} f(c, x) = f(y, g(y)) \\ g(y) = z \end{cases}$$

$$\mathcal{E}\theta = \begin{cases} f(c, g(c)) = f(c, g(c)) \\ g(c) = g(c) \end{cases}$$

$\theta = \{x/g(c), y/c, z/g(c)\}$ — унифициатор системы \mathcal{E}

(и на самом деле даже наиболее общий)

А система $\begin{cases} f(c, y) = f(y, g(y)) \\ g(y) = z \end{cases}$ неунифицируема

Системы уравнений над термами

Утверждение. Множества унификаторов любой пары атомов
 $P(t_1, \dots, t_k), P(s_1, \dots, s_k)$

и системы уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} t_1 = s_1 \\ \dots \\ t_k = s_k \end{array} \right.$$

совпадают

Доказательство. Очевидным образом следует
из определений унификатора атомов и унификатора системы ▼

Унификация переменной и терма

Лемма (о связке). Для любых переменной x и терма t верно:

1. Если $x = t$, то $\varepsilon \in \text{HOY}(x, t)$
2. Если $x \notin \text{Var}_t$, то $\{x/t\} \in \text{HOY}(x, t)$
3. Если $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$, то $\text{Y}(x, t) = \emptyset$

Доказательство

1. Следует из того, что $x\varepsilon = x$ и для любой подстановки η верно $\eta = \varepsilon\eta$
2. Достаточно показать, что если $x \notin \text{Var}_t$, то:
 - a) $\{x/t\}$ — унификатор (переменной x и терма t)
 - b) для любого унификатора θ существует подстановка η , такая что
$$\theta = \{x/t\}\eta$$
- a) Следует из равенств $x\{x/t\} = t = t\{x/t\}$

Унификация переменной и терма

Лемма (о связке). Для любых переменной x и терма t верно:

1. Если $x = t$, то $\varepsilon \in \text{HOY}(x, t)$
2. Если $x \notin \text{Var}_t$, то $\{x/t\} \in \text{HOY}(x, t)$
3. Если $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$, то $\text{Y}(x, t) = \emptyset$

Доказательство

$$26) x \notin \text{Var}_t \quad \text{и} \quad x\theta = t\theta \quad \stackrel{?}{\Rightarrow} \quad \exists \eta \quad \theta = \{x/t\}\eta$$

Достаточно показать, что $\theta = \{x/t\}\theta$

Для этого рассмотрим произвольную переменную y и покажем, что

$$y\theta = y\{x/t\}\theta$$

- Если $y = x$, то $y\theta = x\theta = t\theta = x\{x/t\}\theta = y\{x/t\}\theta$
- Иначе $y \neq x$, и $y\theta = y\{x/t\}\theta$

Следовательно, для любой переменной y верно равенство $y\theta = y\{x/t\}\theta$, а значит, верно и $\theta = \{x/t\}\theta$

Унификация переменной и терма

Лемма (о связке). Для любых переменной x и терма t верно:

1. Если $x = t$, то $\varepsilon \in \text{HOY}(x, t)$
2. Если $x \notin \text{Var}_t$, то $\{x/t\} \in \text{HOY}(x, t)$
3. Если $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$, то $\text{Y}(x, t) = \emptyset$

Доказательство

3. Рассмотрим произвольную подстановку θ и покажем,
что если $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$,
то θ не может являться унифициатором x и t

Пусть $x\theta = s$

Тогда $|x\theta| = |s| < |t\{x/s\}| \leq |t\theta|$ ($|p|$ — длина терма p)

Следовательно, $|x\theta| < |t\theta|$, а значит, $x\theta \neq t\theta$ ▼

Унификация приведённой системы

Система уравнений является **приведённой**, если она имеет вид

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ \dots \\ x_k = t_k \end{cases},$$

где x_1, \dots, x_k — попарно различные переменные,
не встречающиеся в правых частях уравнений

Пример

$$\begin{cases} x = f(y, g(y)) \\ z = w \\ u = g(c) \end{cases}$$
 — приведённая система

Унификация приведённой системы

Система уравнений является **приведённой**, если она имеет вид

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ \dots \\ x_k = t_k \end{cases},$$

где x_1, \dots, x_k — попарно различные переменные, не встречающиеся в правых частях уравнений

Пример

$$\begin{cases} x = f(y, g(y)) \\ x = w \\ y = g(c, c) \\ g(z) = f(c, x) \end{cases} \quad \text{— неприведённая система:}$$

1. $g(z)$ стоит в левой части уравнения, и это не переменная
2. x встречается в левых частях два раза
3. y встречается и в левой, и в правой частях

Унификация приведённой системы

Система уравнений является **приведённой**, если она имеет вид

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ \dots \\ x_k = t_k \end{cases},$$

где x_1, \dots, x_k — попарно различные переменные, не встречающиеся в правых частях уравнений

Лемма (о приведённой системе)

Если $\mathcal{E} = \begin{cases} x_1 = t_1 \\ \dots \\ x_k = t_k \end{cases}$ — приведённая система, то
 $\{x_1/t_1, \dots, x_k/t_k\} \in \text{НОУ}(\mathcal{E})$

Доказательство. Следует из **леммы о связке** ▼

Унификация произвольной системы

Алгоритм, о котором будет дальше идти речь, коротко описывается так:
это **метод исключения переменных**, широко применяющийся
для решения **систем линейных алгебраических уравнений**
и адаптированный к свободной алгебре термов

Напоминание, как работает этот метод
для уравнений над действительными числами:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 3 - z + y \\ 2y + 3z = x + 2 \end{array} \right. \mapsto \left\{ \begin{array}{l} x = 3 - z + y \\ 2y + 3z = 3 - z + y + 2 \end{array} \right. \mapsto \left\{ \begin{array}{l} x = 3 - z + y \\ y = 5 - 4z \end{array} \right.$$

↓

решения очевидны → $\left\{ \begin{array}{l} x = 8 - 5z \\ y = 5 - 4z \end{array} \right.$ ← $\left\{ \begin{array}{l} x = 3 - z + 5 - 4z \\ y = 5 - 4z \end{array} \right.$

В свободной алгебре термов вместо спектра арифметических операций
содержится только одна операция композиции,
но это не мешает адаптировать метод без особых усилий

Унификация произвольной системы

Алгоритм унификации (\mathfrak{U}):¹

Далее будут описаны 6 правил преобразования системы уравнений

Эти правила произвольно (недетерминированно) применяются к системе, пока не станет верным одно из условий:

- ▶ получена приведённая система уравнений
 - ▶ ответ: унификатор из **леммы о приведённой системе**
- ▶ явно установлена невозможность унификации системы
 - ▶ ответ: СТОП: система неунифицируема

¹ Martelli A., Montanari U. An efficient unification algorithm. 1982

Унификация произвольной системы

Правила преобразования системы уравнений

Упрощение системы:

($x \in \text{Var}$, $t \in \text{Term}$)

Triv: удалить $t = t$

Swap: заменить $t = x$ на $x = t$, если $t \notin \text{Var}$

Func: заменить $f(t_1, \dots, t_k) = f(s_1, \dots, s_k)$ на $\begin{cases} t_1 = s_1 \\ \dots \\ t_k = s_k \end{cases}$

Elim: если в системе содержится уравнение $Eq : x = t$, где

- ▶ $x \notin \text{Var}_t$ и
- ▶ x встречается в других уравнениях системы

то применить подстановку $\{x/t\}$ ко всем уравнениям системы, кроме Eq

Унификация произвольной системы

Правила преобразования системы уравнений

Явная неунифицируемость:

($x \in \text{Var}$, $t \in \text{Term}$)

NElim: если в системе содержится уравнение $x = t$,
где $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$, то
СТОП: система неунифицируема

NFunc: если в системе содержится уравнение
 $f(t_1, \dots, t_k) = g(s_1, \dots, s_m)$, где $f \neq g$, то
СТОП: система неунифицируема

Унификация произвольной системы

Примеры

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} = \left\{ \begin{array}{l} f(x, g(y)) = f(g(y), x) \\ c = y \end{array} \right. & \xrightarrow{\text{Func}} & \left\{ \begin{array}{l} x = g(y) \\ g(y) = x \\ c = y \end{array} \right. \\ & & \text{Swap} \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} x = g(\textcolor{green}{c}) \\ g(\textcolor{green}{c}) = g(c) \\ y = c \end{array} \right. & \xleftarrow{\text{Elim } \times 2} & \left\{ \begin{array}{l} x = g(y) \\ g(y) = x \\ \textcolor{green}{y} = c \end{array} \right. \\ & & \text{Triv} \downarrow \\ \left\{ \begin{array}{l} x = g(c) \\ \textcolor{green}{y} = c \end{array} \right. & \xleftarrow{\text{----- приведённая система}} & \end{array}$$

Ответ: $\{x/g(c), y/c\} \in \text{HOY}(\mathcal{E})$

Унификация произвольной системы

Примеры

$$\mathcal{E}' = \left\{ \begin{array}{l} f(x, g(x)) = h(g(y), x) \\ c = y \end{array} \right. \xrightarrow{\text{NFunc}} \text{СТОП}$$

Ответ: $Y(\mathcal{E}') = \emptyset$

$$\mathcal{E}'' = \left\{ \begin{array}{l} f(x, g(x)) = f(g(y), x) \\ c = y \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Func}} \left\{ \begin{array}{l} x = g(y) \\ g(x) = x \\ c = y \end{array} \right.$$

Swap ↓

$$\text{СТОП} \xleftarrow{\text{NElim}} \left\{ \begin{array}{l} x = g(y) \\ \textcolor{green}{x} = g(x) \\ c = y \end{array} \right.$$

Ответ: $Y(\mathcal{E}'') = \emptyset$

Унификация произвольной системы

Теорема (об унификации). Для любой системы уравнений \mathcal{E}_0

- ▶ алгоритм \mathfrak{U} завершает работу на \mathcal{E}_0 (завершаемость)
- ▶ по завершении алгоритмом \mathfrak{U} выдаётся подстановка или сообщение СТОП (успешность)
- ▶ если выдана подстановка θ , то $\theta \in \text{НОУ}(\mathcal{E}_0)$ (корректность)
- ▶ если выдано сообщение СТОП,
то система \mathcal{E} неунифицируема (полнота)

Следствие. Для любых атомов A и B логики предикатов верно:

$$\mathbf{Y}(A, B) \neq \emptyset \Leftrightarrow \text{НОУ}(A, B) \neq \emptyset$$

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\rightarrow \infty$)

Далее будет строго сформулированы и обоснованы следующие факты:

- ▶ на каждом шаге работы алгоритма система становится проще
- ▶ после конечного числа шагов работы алгоритма обязательно получается система, которую нельзя упростить

Предложим характеристику системы, которая
убывает на каждом шаге и при этом
не может убывать бесконечно долго

Завершаемость алгоритма

очевидным образом следует из существования такой характеристики:
если система упрощается на каждом шаге
и не может упрощаться бесконечно,
то число шагов конечно

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\sim \infty$)

Переменную x назовём **приведённой** в системе \mathcal{E} , если \mathcal{E}

- ▶ содержит уравнение вида $x = t$, где $x \notin \text{Var}_t$, и
- ▶ не содержит x в других уравнениях

Характеристикой системы \mathcal{E} объявим упорядоченную тройку чисел $\mathcal{H}(\mathcal{E}) = \langle \text{vr}(\mathcal{E}), \text{fs}(\mathcal{E}), \text{eq}(\mathcal{E}) \rangle$, где

- ▶ $\text{vr}(\mathcal{E})$ — число неприведённых переменных системы \mathcal{E}
- ▶ $\text{fs}(\mathcal{E})$ — суммарное число функциональных символов и констант в левых частях уравнений \mathcal{E}
- ▶ $\text{eq}(\mathcal{E})$ — число уравнений системы \mathcal{E}

Лексикографический порядок на тройках целых чисел определяется так:

$$\langle n_1, n_2, n_3 \rangle \succ \langle m_1, m_2, m_3 \rangle \Leftrightarrow \begin{cases} n_1 > m_1 \\ n_1 = m_1, \quad n_2 > m_2 \\ n_1 = m_1, \quad n_2 = m_2, \quad n_3 > m_3 \end{cases}$$

Пример: $\langle 2, 11, 2 \rangle \succ \langle 2, 10, 5578 \rangle \succ \langle 2, 10, 5577 \rangle \succ \langle 1, 1001, 78 \rangle$

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\sim \infty$)

$$\mathcal{H}(\mathcal{E}) = \langle vr(\mathcal{E}), fs(\mathcal{E}), eq(\mathcal{E}) \rangle$$

$vr(\mathcal{E})$: число неприведённых переменных

$fs(\mathcal{E})$: число функциональных символов и констант в левых частях

$eq(\mathcal{E})$: число уравнений

Факт 1: при применении правил упрощения

характеристика системы уменьшается относительно \succ

$$\mathcal{E}_1 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ t = t \\ \dots \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Triv}} \mathcal{E}'_1 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ \dots \end{array} \right.$$

$$vr(\mathcal{E}_1) \geq vr(\mathcal{E}'_1) \quad fs(\mathcal{E}_1) \geq fs(\mathcal{E}'_1) \quad eq(\mathcal{E}_1) > eq(\mathcal{E}'_1)$$

$$\mathcal{E}_2 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ t = x \\ \dots \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Swap}} \mathcal{E}'_2 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ x = t \\ \dots \end{array} \right.$$

$$vr(\mathcal{E}_2) \geq vr(\mathcal{E}'_2) \quad fs(\mathcal{E}_2) > fs(\mathcal{E}'_2)$$

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\sim \infty$)

$$\mathcal{H}(\mathcal{E}) = \langle vr(\mathcal{E}), fs(\mathcal{E}), eq(\mathcal{E}) \rangle$$

$vr(\mathcal{E})$: число неприведённых переменных

$fs(\mathcal{E})$: число функциональных символов и констант в левых частях

$eq(\mathcal{E})$: число уравнений

Факт 1: при применении правил упрощения

характеристика системы уменьшается относительно \succ

$$\mathcal{E}_3 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ f(t_1, \dots, t_k) = f(s_1, \dots, s_k) \\ \dots \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Func}} \mathcal{E}'_3 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ t_1 = s_1 \\ \dots \\ t_k = s_k \\ \dots \end{array} \right.$$

$$vr(\mathcal{E}_3) \geq vr(\mathcal{E}'_3) \quad fs(\mathcal{E}_3) > fs(\mathcal{E}'_3)$$

$$\mathcal{E}_4 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ x = t \\ \dots \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Elim}} \mathcal{E}'_4 = \left\{ \begin{array}{l} \dots \{x/t\} \\ x = t \\ \dots \{x/t\} \end{array} \right.$$

$$vr(\mathcal{E}_4) > vr(\mathcal{E}'_4)$$

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\sim \infty$)

$\mathcal{H}(\mathcal{E}) = \langle vr(\mathcal{E}), fs(\mathcal{E}), eq(\mathcal{E}) \rangle$

$vr(\mathcal{E})$: число неприведённых переменных

$fs(\mathcal{E})$: число функциональных символов и констант в левых частях

$eq(\mathcal{E})$: число уравнений

Факт 2: характеристика не может бесконечно долго убывать относительно \succ

Чтобы «прочувствовать» этот факт, представьте, что характеристикой $\langle a, b, c \rangle$ описывается **мешок конфет**: a вкусных, b обычных и c невкусных

Тогда убывание характеристики можно представить как одну из операций в пункте обмена конфет:

- ▶ отдать вкусную конфету
и взамен получить сколько угодно обычных и невкусных
- ▶ отдать обычную конфету
и взамен получить сколько угодно невкусных
- ▶ отдать невкусную конфету

Оказывается, что так меняться конфетами невыгодно,
и если слишком увлечься, то мешок непременно опустеет

Доказательство теоремы об унификации

Завершаемость ($\mathcal{E}_0 \not\sim \infty$)

$$\mathcal{H}(\mathcal{E}) = \langle vr(\mathcal{E}), fs(\mathcal{E}), eq(\mathcal{E}) \rangle$$

$vr(\mathcal{E})$: число неприведённых переменных

$fs(\mathcal{E})$: число функциональных символов и констант в левых частях

$eq(\mathcal{E})$: число уравнений

Факт 2: характеристика не может бесконечно долго убывать относительно \succ

Лемма. Не существует бесконечной последовательности троек неотрицательных целых чисел, убывающей относительно \succ

Доказательство (леммы). Можете попробовать сами, если хотите

Отсутствие бесконечных убывающих последовательностей элементов в **частично упорядоченном множестве (ЧУМ)** принято называть свойством обрыва убывающих цепей и **фундированностью** множества

Фундированные ЧУМ нередко используются для обоснования завершаемости алгоритмов

Доказательство теоремы об унификации

Успешность ($\mathcal{E}_0 \rightsquigarrow \theta$ /СТОП)

Предположим, что алгоритм неуспешен

Это означает, что на очередном шаге получена
неприведённая система \mathcal{E} , к которой невозможно применить
ни одно из правил Triv, Swap, Func, Elim, NFunc, NElim

Невозможно применить правила Triv, Swap, Func, NFunc \Rightarrow
в левых частях \mathcal{E} содержатся только переменные

Невозможно применить правила Elim, NElim \Rightarrow
все переменные в левых частях \mathcal{E} являются приведёнными

Следовательно, \mathcal{E} — система, в левых частях которой
располагаются только приведённые переменные,
то есть \mathcal{E} — приведённая система (*противоречие*)

Доказательство теоремы об унификации

Корректность ($\mathcal{E}_0 \rightsquigarrow \theta \Rightarrow \theta \in \text{НОУ}(\mathcal{E}_0)$)

Системы уравнений \mathcal{E} и \mathcal{E}' **равносильны**, если $\text{У}(\mathcal{E}) = \text{У}(\mathcal{E}')$

Достаточно показать, что при применении правил упрощения
(Triv, Swap, Func, Elim)

обязательно получается система, равносильная исходной

Для правил Triv, Swap и Func это **довольно просто**,
так что подробно остановимся только на «трудном» правиле Elim

$$\mathcal{E} = \left\{ \begin{array}{l} \dots \\ x = t \\ \dots \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Elim}} \mathcal{E}' = \left\{ \begin{array}{l} \dots \{x/t\} \\ x = t \\ \dots \{x/t\} \end{array} \right.$$

Покажем, что системы \mathcal{E} и \mathcal{E}' равносильны

Доказательство теоремы об унификации

Корректность ($\mathcal{E}_0 \rightsquigarrow \theta \Rightarrow \theta \in \text{НОУ}(\mathcal{E}_0)$)

$$\mathcal{E} = \begin{cases} \dots \\ x = t \\ \dots \end{cases} \xrightarrow{\text{Elim}} \mathcal{E}' = \begin{cases} \dots \{x/t\} \\ x = t \\ \dots \{x/t\} \end{cases}$$

$$U(\mathcal{E}) \stackrel{?}{=} U(\mathcal{E}')$$

(\subseteq): Пусть $\eta \in U(\mathcal{E})$

Тогда $x\eta = t\eta$

Из доказательства леммы о связке: $\eta = \{x/t\}\eta$, а значит,

$$\begin{cases} \dots \eta \\ x\eta = t\eta \\ \dots \eta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dots \{x/t\}\eta \\ x\eta = t\eta \\ \dots \{x/t\}\eta \end{cases}$$

Следовательно, η — унифициатор системы \mathcal{E}'

(\supseteq): Рассуждения аналогичны

Доказательство теоремы об унификации

Полнота ($\mathcal{E}_0 \rightsquigarrow \text{СТОП} \Rightarrow U(\mathcal{E}_0) = \emptyset$)

Для определённости положим, что «СТОП» выдано для системы \mathcal{E}

Пусть для этого было применено правило NFunc

Тогда \mathcal{E} содержит уравнение $f(\dots) = g(\dots)$, где $f \neq g$

Ни для какой подстановки θ не верно $f(\dots)\theta = g(\dots)\theta$

Иначе для этого было применено правило NElm

Тогда \mathcal{E} содержит уравнение $x = t$, где $x \in \text{Var}_t$ и $x \neq t$

По лемме о связке, ни для какой подстановки θ не верно $x\theta = t\theta$

Следовательно, $U(\mathcal{E}) = \emptyset$

Система \mathcal{E} была получена из \mathcal{E}_0 применением правил
Triv, Swap, Func, Elim

Согласно рассуждениям в обосновании корректности алгоритма,
системы \mathcal{E} и \mathcal{E}_0 равносильны

Значит, $U(\mathcal{E}_0) = \emptyset$ ▼