

Математические методы верификации схем и программ

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы
→ Математические методы верификации схем и программ

Блок 12

Автоматы Бюхи
Обобщённые автоматы Бюхи

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич
E-mail:
valdus@yandex.ru

Слова и языки

Алфавит — это конечное непустое множество, элементы которого называются буквами, или символами

Слово над алфавитом Σ — это конечная последовательность букв из Σ

ω -слово над алфавитом Σ — это бесконечная последовательность букв из Σ

Например, если множество атомарных высказываний конечно, то трасса — это ω -слово над алфавитом событий

Σ^* и Σ^ω — соответственно множество всех слов и всех ω -слов над алфавитом Σ

В записи слов и ω -слов будем опускать разделители:

$$\langle\langle x_0, x_1, x_2, \dots \rangle\rangle = \langle\langle x_0 x_1 x_2 \dots \rangle\rangle$$

Языком и ω -языком над заданным алфавитом будем называть соответственно множество слов и множество ω -слов


Автоматы Бюхи

Автомат Бюхи над алфавитом Σ — это система $A = (S, S_0, \rightarrow, F)$, где:

- ▶ S — конечное множество **состояний**
- ▶ S_0 — множество **начальных** состояний
- ▶ $\rightarrow \subseteq S \times \Sigma \times S$ — отношение **переходов**
 - ▶ Изображение семейства переходов $(s, x, s'), (s, y, s'), \dots : s \xrightarrow{x,y,\dots} s'$
- ▶ $F \subseteq S$ — множество **допускающих** состояний

Как и для моделей Кripке, для автоматов будут применяться графовые терминология и обозначения

Пример:



○ — состояние

○ — начальное состояние

● — допускающее состояние

Автоматы Бюхи

Будем говорить, что бесконечный путь

$$s_0 \xrightarrow{x_0} s_1 \xrightarrow{x_1} s_2 \xrightarrow{x_2} \dots$$

в автомате Бюхи **порождается** ω -словом $x_0x_1x_2\dots$

Вычисление автомата Бюхи — это бесконечный путь, начинающийся в начальном состоянии

$\text{Tr}(A, w)$ — множество всех вычислений A , порождающихся ω -словом w

$\text{inf}(\rho)$ — множество состояний, встречающихся бесконечно часто в бесконечном пути ρ

Вычисление ρ автомата Бюхи $A = (S, S_0, \rightarrow, F)$ **успешно** (является **принимающим**), если хотя бы одно заключительное состояние повторяется в нём бесконечно часто

$$(\text{inf}(\rho) \cap F \neq \emptyset)$$

ω -слово w **принимается** автоматом Бюхи A , если A содержит хотя бы одно успешное вычисление, порождаемое этим словом


$$(\exists \rho \in \text{Tr}(A, w) : \text{inf}(\rho) \cap F \neq \emptyset)$$

Автоматы Бюхи

$L(A)$ — так будет обозначаться ω -язык, **распознающийся** автоматом A (или, более коротко, — **ω -язык автомата A**): множество всех ω -слов, принимаемых автоматом A

Пример

Автоматом Бюхи A



распознаётся ω -язык

$$L(A) = \{ Wabcabc\ldots bc\cdots \mid W \in \{a, b\}^*\}$$

На некоторых этапах автоматного алгоритма удобно будет строить автоматы в более общей постановке, в которой автомат может содержать и более одного допускающего множества

Обобщённый автомат Бюхи

Обобщённый автомат Бюхи над алфавитом Σ — это система $GA = (S, S_0, \rightarrow, \mathcal{F})$, где:

- ▶ S, S_0 и \rightarrow — такие же множества состояний, начальных состояний и переходов, что и в автомате Бюхи
- ▶ $\mathcal{F} \subseteq 2^S$ — семейство допускающих множеств состояний

Все понятия, введённые для автоматов Бюхи, кроме успешного вычисления, дословно переносятся на обобщённые автоматы Бюхи

Вычисление ρ обобщённого автомата Бюхи GA успешно, если в каждом допускающем множестве есть хотя бы одно состояние, повторяющееся в ρ бесконечно часто

$$(\forall F \in \mathcal{F} : \inf(\rho) \cap F \neq \emptyset)$$

Формульная запись того, что слово w принимается автоматом $A = (S, S_0, \rightarrow, \mathcal{F})$, выглядит так:


$$\exists \rho \in \text{Tr}(A, w) : \forall F \in \mathcal{F} : \inf(\rho) \cap F \neq \emptyset$$

Обобщённый автомат Бюхи

Далее состояния, принадлежащие одному допускающему множеству, изображаются как окрашенные в один (не белый) цвет

Если вершина принадлежит нескольким принимающим множествам, то она окрашивается во все соответствующие цвета

Пример



Успешное вычисление этого автомата — это вычисление, в котором бесконечно часто повторяются хотя бы одна синяя вершина и хотя бы одна зелёная вершина

Этим автоматом распознаётся множество всех ω -слов вида WbU , где

- ▶ $W \in \{a, b\}^*$ и
- ▶ U — любое ω -слово над $\{a, b\}$, содержащее бесконечно много « a », но ни одного « aa »

Обобщённый автомат Бюхи

Автомат Бюхи $A = (S', S'_0, \rightarrow, F)$ назовём **разобобщением** обобщённого автомата Бюхи $GA = (S, S_0, \rightarrow, \mathcal{F})$, если он устроен так:

- ▶ Произвольно упорядочим допускающие множества GA :


$$\mathcal{F} = \{F_0, \dots, F_{k-1}\}$$

- ▶ $S' = S \times \{0, 1, \dots, k - 1\}$
- ▶ $S'_0 = S_0 \times \{0\}$
- ▶ $F = \{(s, i) \mid s \in F_i, i \in \{0, 1, \dots, k - 1\}\}$
- ▶ Для каждого перехода $s \xrightarrow{x} s'$ автомата GA и каждого $i \in \{0, 1, \dots, k - 1\}$ в A включаются следующие переходы (и только такие переходы):
 - ▶ если $(s, i) \notin F$, то $(s, i) \xrightarrow{x} (s', i)$
 - ▶ иначе $(s, i) \xrightarrow{x} (s', (i + 1) \bmod k)$

Обобщённый автомат Бюхи


Пример

Для обобщённого автомата Бюхи GA




с порядком допускающих множеств (синее, зелёное) соответствует такое разобобщение A :


$(s, \boxed{0}) :$



$(s, \boxed{1}) :$



Пример взаимно соответствующих вычислений этих автоматов:



Теорема о разобщении автомата Бюхи

Для любого обобщённого автомата Бюхи GA и любого его разобщения A верно $L(A) = L(GA)$

Доказательство ($L(A) \subseteq L(GA)$)

Для определённости положим, что $GA = (S, S_0, \rightarrow, \{F_0, \dots, F_{k-1}\})$ и $A = (S', S'_0, \mapsto, F)$

Рассмотрим произвольное ω -слово $w \in L(A)$

В A существует успешное вычисление ρ вида $(s_0, i_0) \xrightarrow{w[0]} (s_1, i_1) \xrightarrow{w[1]} \dots$

По устройству A и успешности ρ , в ρ содержится бесконечная подпоследовательность $(q_0, 0), (q_1, 1), \dots, (q_n, n \bmod k), \dots$, содержащая только элементы F

По построению A :

- ▶ $\rho_g = (s_0 \xrightarrow{w[0]} s_1 \xrightarrow{w[1]} \dots)$ — вычисление GA
- ▶ Для всех $i \in \{0, 1, 2, \dots\}$ верно $q_i \in F_{i \bmod k}$

Значит, для каждого $i \in \{0, 1, \dots, k-1\}$, верно $\inf(\rho_g) \cap F_i \neq \emptyset$: этому пересечению принадлежат, например, состояния $q_i, q_{i+k}, q_{i+2k}, q_{i+3k}, \dots$
Следовательно, ρ_g — успешное вычисление GA , а значит, $w \in L(GA)$

Теорема о разобщении автомата Бюхи

Для любого обобщённого автомата Бюхи GA и любого его разобщения A верно $L(A) = L(GA)$

Доказательство ($L(A) \supseteq L(GA)$)

$$(GA = (S, S_0, \rightarrow, \{F_0, \dots, F_{k-1}\}), A = (S', S'_0, \mapsto, F))$$

Рассмотрим произвольное ω -слово $w \in L(GA)$

В GA существует успешное вычисление ρ_g вида $s_0 \xrightarrow{w[0]} s_1 \xrightarrow{w[1]} \dots$

По успешности ρ_g , для этого вычисления существуют следующие индексы i_0, i_1, i_2, \dots :

- ▶ i_0 — наименьший, для которого $s_{i_0} \in F_0$
- ▶ $i_m, m \geq 1$, — наименьший, для которого $i_m > i_{m-1}$ и $s_{i_m} \in F_{m \bmod k}$

Тогда, по построению, в A содержится успешное вычисление, принимающее w :

$$\begin{aligned} (s_0, 0) &\mapsto \dots \mapsto (s_{i_0}, 0) \mapsto (s_{i_0+1}, 1) \mapsto \dots \mapsto (s_{i_1}, 1) \\ &\mapsto (s_{i_1+1}, 1) \mapsto \dots \mapsto \dots \mapsto (s_{i_{k-1}}, k-1) \mapsto (s_{i_{k-1}+1}, 0) \mapsto \dots \end{aligned}$$

Значит, $w \in L(A)$ ▼