

# Математическая логика и логическое программирование

[mk.cs.msu.ru](http://mk.cs.msu.ru) → Лекционные курсы  
→ Математическая логика и логическое программирование (3-й поток)

## Блок 13


Метод семантических таблиц  
в логике предикатов:  
полнота табличного вывода

Лектор:  
Подымов Владислав Васильевич  
E-mail:  
[valdus@yandex.ru](mailto:valdus@yandex.ru)

# Напоминание

Корректность табличного вывода в логике предикатов:

если для таблицы  $T_0$  существует успешный табличный вывод,  
то таблица  $T_0$  невыполнима



А верно ли утверждение в обратную сторону?

(если таблица невыполнима, то для неё существует успешный вывод)

## Теорема (о полноте табличного вывода в ЛП)

Для любой невыполнимой семантической таблицы  
существует успешный табличный вывод

Доказательство.

Рассмотрим произвольную невыполнимую семантическую таблицу

$$T_0 = \langle \Gamma_0 \mid \Delta_0 \rangle$$

Покажем, как можно построить успешный вывод  $\mathfrak{D}$  для  $T_0$

Для простоты обсудим частный случай с такими ограничениями:

- ▶ множества  $\Gamma_0$ ,  $\Delta_0$  конечны
- ▶ все формулы из  $\Gamma_0$ ,  $\Delta_0$  замкнуты
- ▶ в сигнатуре нет ни одного функционального символа


Сформулируем **стратегию** построения вывода,  
которой (как будет показано) достаточно придерживаться  
для построения требуемого вывода  $\mathfrak{D}$ , начиная с исходной таблицы  $T_0$

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

1. Дерево вывода строится при помощи обхода в ширину

*То есть* правила применяются к незакрытым неатомарным таблицам в порядке их появления в построенном фрагменте дерева



*Тогда* каждая таблица каждой ветви вывода рано или поздно будет построена


## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

- Правила применяются к формулам в порядке очереди

*То есть:*

- неатомарные формулы таблицы пронумерованы
- правило вывода применяется к **первой формуле**
- результат применения правила записывается **последним**




*Тогда* в каждой ветви вывода к каждой неатомарной формуле рано или поздно будет применено правило табличного вывода

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

3. При применении правил  $L\forall$ ,  $R\exists$  подставляются все имеющиеся в таблице константы (с, если констант нет)



Тогда в каждой бесконечной ветви вывода  
для каждого квантора  $\forall$  слева и  $\exists$  справа  
каждая константа рано или поздно будет подставлена

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Покажем, что любой вывод  $\mathfrak{D}$ , построенный для  $T_0 = \langle \Gamma_0 \mid \Delta_0 \rangle$  согласно предложенной стратегии, успешен

*Предположим, что это не так:* вывод  $\mathfrak{D}$  неуспешен — получим из этого выполнимость таблицы  $T_0$ , противоречащую выбору таблицы  $T_0$

Заменим в  $\mathfrak{D}$  каждую незакрытую атомарную таблицу  $T_{atom}$  на бесконечную ветвь  $T_{atom} \rightarrow T_{atom} \rightarrow T_{atom} \rightarrow \dots$

Тогда в полученном дереве обязательно найдётся бесконечная ветвь  $\mathcal{T}$ , состоящая только из незакрытых таблиц:

$$T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots$$

По этой ветви построим интерпретацию  $\mathcal{I}$ , такую что:

- ▶ каждая формула из  $\Gamma_0$  выполнима в  $\mathcal{I}$
- ▶ каждая формула из  $\Delta_0$  невыполнима в  $\mathcal{I}$

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$

$$\mathcal{I} = \langle D, \overline{\text{Const}}, -, \overline{\text{Pred}} \rangle, \text{ где}$$

- ▶ предметная область — это все константы всех формул в  $\mathfrak{T}$ :

$$D = \bigcup_{i \geq 0} \text{Const}_i = \text{Const}_\omega, \text{ где } \text{Const}_i \text{ — все константы в } T_i$$

- ▶ значение каждой константы — это её изображение (*она сама*):

$$\bar{c} = c$$

- ▶ предикат истинен  $\Leftrightarrow$  он встречается в левых частях таблиц  $\mathfrak{T}$ :

$$\bar{P}(c_1, \dots, c_k) = t \Leftrightarrow P(c_1, \dots, c_k) \in \bigcup_{i \geq 0} \Gamma_i = \Gamma_\omega$$

Осталось показать *индукцией по структуре формулы*, что

- ▶ каждая формула из  $\Gamma_\omega$  выполнима в  $\mathcal{I}$
- ▶ каждая формула из  $\Delta_\omega = \bigcup_{i \geq 0} \Delta_i$  невыполнима в  $\mathcal{I}$

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

*База индукции:*  $\varphi$  — атом

Тогда  $\varphi = P(c_1, \dots, c_k)$ , где  $c_1, \dots, c_k \in \text{Const}_\omega$  (почему?)

*Подслучай 1:*  $P(c_1, \dots, c_k) \in \Gamma_\omega$

Тогда  $\overline{P}(c_1, \dots, c_k) = \text{t}$ , а значит,  $\mathcal{I} \models \varphi$

*Подслучай 2:*  $P(c_1, \dots, c_k) \in \Delta_\omega$

Тогда  $P(c_1, \dots, c_k) \notin \Gamma_\omega$  (почему?)

Значит,  $\overline{P}(c_1, \dots, c_k) = \text{f}$  и  $\mathcal{I} \not\models \varphi$

## Индуктивный переход

*Предположение индукции:* для каждой формулы, содержащей менее  $N$  логических операций, утверждение доказано

*Рассматриваемый случай:* формула  $\varphi$  содержит ровно  $N$  логических операций

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

*Переход 1:*  $\varphi = \psi \rightarrow \chi$

*Подслучай 1:*  $\varphi \in \Gamma_\omega$

В ветви  $\mathfrak{T}$  существует таблица  $T_i$ , такая что правило вывода применяется к  $\varphi$  в левой части этой таблицы (почему?)

Значит, верно хотя бы одно из двух:

- ▶  $\chi \in \Gamma_{i+1}$ , и тогда  $\mathcal{I} \models \chi$  и  $\mathcal{I} \models \varphi$
- ▶  $\psi \in \Delta_{i+1}$ , и тогда  $\mathcal{I} \not\models \psi$  и  $\mathcal{I} \models \varphi$

*Подслучай 2:*  $\varphi \in \Delta_\omega$  — рассуждения аналогичны

*Переход 2/3/4:*  $\varphi = \psi \& \chi / \psi \vee \chi / \neg \psi$  — рассуждения аналогичны

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

*Переход 5:*  $\varphi = \forall x \psi$

*Подслучай 1:*  $\varphi \in \Gamma_\omega$

Тогда  $\psi\{x/c\} \in \Gamma_\omega$  для любой константы  $c \in \text{Const}_\omega$  (почему?)

Значит, для любой константы  $c \in \text{Const}_\omega$  верно:  $\mathcal{I} \models \psi\{x/c\}$

Но это и означает  $\mathcal{I} \models \forall x \psi$

*Подслучай 2:*  $\varphi \in \Delta_\omega$

В ветви  $\mathfrak{T}$  существует таблица  $T_i$ , такая что правило вывода применяется к  $\varphi$  в правой части этой таблицы

Значит,  $\psi\{x/c\} \in \Delta_{i+1}$  для некоторой  $c \in \text{Const}_{i+1} \subseteq \text{Const}_\omega$

Тогда  $\mathcal{I} \not\models \psi\{x/c\}$ , и следовательно,  $\mathcal{I} \not\models \forall x \psi$

*Переход 6:*  $\varphi = \exists x \psi$  — рассуждения аналогичны

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$

### Итоги рассуждений

Существует (и явно описана) интерпретация  $\mathcal{I}$ , такая что

- ▶ все формулы в левых частях таблиц из  $\mathfrak{T}$  выполнимы в  $\mathcal{I}$
- ▶ все формулы в правых частях таблиц из  $\mathfrak{T}$  невыполнимы в  $\mathcal{I}$

В частности, все формулы из  $\Gamma_0$  выполнимы в  $\mathcal{I}$

и все формулы из  $\Delta_0$  невыполнимы в  $\mathcal{I}$

Значит, таблица  $T_0$  выполнима, что противоречит  
невыполнимости этой таблицы, заявленной в начале доказательства

Противоречие получено в предположении о том,  
что вывод, построенный для  $T_0$ , неуспешен

Значит, предположение неверно:

любой вывод, построенный для невыполнимой таблицы  $T_0$   
согласно предложенным правилам, успешен ▼

## Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Вопрос «на засыпку»:

а как адаптировать доказательство к общему случаю?

То есть:

- ▶ Какой порядок обработки формул позволит «справедливо» обращаться со счётными множествами формул?
- ▶ Какие термы подставлять, если в сигнатуре алфавита есть функциональные символы?
- ▶ Как задать и использовать интерпретацию  $\mathcal{I}$ , если в таблицах встречаются незамкнутые формулы?

## Следствие

Семантическая таблица  $T$  логики предикатов невыполнима  $\Leftrightarrow$   
для неё существует успешный табличный вывод

## Доказательство.

Вытекает из теорем о **корректности** и **полноте** табличного вывода ▼

**Следствие.** Для любой формулы  $\varphi$  логики предикатов верно:

$$\models \varphi \Leftrightarrow \text{для семантической таблицы } \langle | \varphi \rangle \\ \text{существует успешный табличный вывод}$$

**Доказательство.** Вытекает из первого следствия

и теоремы о табличной проверке общезначимости формул ЛП ▼