

# Математическая логика

Лектор:

Подымов Владислав Васильевич

e-mail:

[valdus@yandex.ru](mailto:valdus@yandex.ru)

2017, весенний семестр

# Лекция 3

Логика предикатов

Синтаксис: термы и формулы

Семантика: интерпретации, отношение выполнимости

Выполнимые и общезначимые формулы

Модели

Логическое следствие

Проблема общезначимости формул

# Вступление

Попробуем формализовать такое высказывание:

**Если кто-то прогуливает лекции, то экзамен он не сдаст**

# Вступление

Попробуем формализовать такое высказывание:

Если кто-то прогуливает лекции, то экзамен он не сдаст

*ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ:*

$\text{Shirk} \rightarrow \neg \text{Pass}$

# Вступление

Попробуем формализовать такое высказывание:

Если кто-то прогуливает лекции, то экзамен не сдаст его сосед

*логика предикатов:*

$$\forall x (\text{Shirk}(x) \rightarrow \neg \text{Pass}(\text{neighbour}(x)))$$

**Логика предикатов** изучает законы причинно-следственной зависимости между утверждениями, представленными в виде отношений

**Формальный язык** логики предикатов ориентирован на описание таких отношений

# Немного о названии

Предикат<sup>1</sup> (лат. praedicatum — сказанное, сказуемое):

понятие, определяющее предмет суждения (субъект)

Кто-то прогуливает лекцию  
(субъект) (предикат) (объект)

В более общем смысле:

- ▶ свойство, атрибут предмета, явления, события, ...
- ▶ отношение между явлениями, предметами, событиями, ...

---

<sup>1</sup> Ожегов, Шведова. Толковый словарь русского языка

# Немного о названии



классическая  
логика  
предикатов  
первого порядка

# Немного о названии



логика  
предикатов  
первого порядка



# Немного о названии



логика  
предикатов

# Немного о названии

IV

логика

первого порядка

## Немного о названии

Будем использовать такое название:

логика  
предикатов

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$

Предметные константы

— это **имена предметов**

Функциональные символы

обозначают **операции**

над предметами

Предикатные символы

обозначают **отношения**

между предметами

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$$

Предметные константы

$$\text{Const} = \{c_1, c_2, \dots\}$$

Функциональные символы

$$\text{Func} = \{f_1^{(n_1)}, f_2^{(n_2)}, \dots\}$$

Предикатные символы

$$\text{Pred} = \{P_1^{(m_1)}, P_2^{(m_2)}, \dots\}$$

$n_i$  — местность функционального символа  $f_i$

$m_i$  — местность предикатного символа  $P_i$

запись местности будет опускаться

Тройка  $\langle \text{Const}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$  — сигнатура алфавита

# Алфавит

## I. Базовые символы

Предметные переменные

$$\text{Var} = \{x_1, x_2, \dots\}$$

Предметные константы

$$\text{Const} = \{c_1, c_2, \dots\}$$

Функциональные символы

$$\text{Func} = \{f_1^{(n_1)}, f_2^{(n_2)}, \dots\}$$

Предикатные символы

$$\text{Pred} = \{P_1^{(m_1)}, P_2^{(m_2)}, \dots\}$$

## Примеры

констант:

$$0, 1, \pi, c, \dots$$

функциональных символов:

$$+^{(2)}, \cdot^{(2)}, \lim^{(3)}, \dots$$

предикатных символов:

$$<^{(2)}, =^{(2)}, \dots$$

# Алфавит

## II. Логические связки

|            |                      |               |
|------------|----------------------|---------------|
| Конъюнкция | (логическое И)       | $\&$          |
| Дизъюнкция | (логическое ИЛИ)     | $\vee$        |
| Отрицание  | (логическое НЕ)      | $\neg$        |
| Импликация | (логическое ЕСЛИ-ТО) | $\rightarrow$ |

## III. Кванторы

|                       |                  |           |
|-----------------------|------------------|-----------|
| Квантор всеобщности   | (“для каждого”)  | $\forall$ |
| Квантор существования | (“хотя бы один”) | $\exists$ |

## IV. Знаки препинания

|             |     |
|-------------|-----|
| Скобки      | ( ) |
| Разделитель | ,   |

# Синтаксис: термы

Терм — это:

|                      |  |
|----------------------|--|
| $x$                  | $(x \in \text{Var})$   |
| $c$                  | $(c \in \text{Const})$                                       |
| $f(t_1, \dots, t_n)$ | $(f^{(n)} \in \text{Func}; t_1, \dots, t_n \text{ — термы})$ |

Term — множество всех термов в заданном алфавите

Пусть  $t$  — терм. Тогда:

$\text{Var}_t$  — множество всех переменных, входящих в терм  $t$

$t(x_1, \dots, x_n)$  — синоним  $t$ , если  $\text{Var}_t \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$

$\tilde{x}^n$  — сокращение для “ $x_1, \dots, x_n$ ”

Терм  $t$  — **основной**, если  $\text{Var}_t = \emptyset$



# Синтаксис: термы

## Примеры термов

$z$  ( $z \in \text{Var}$ )

$3$  ( $3 \in \text{Const}$ )

$\text{exp}(3, z)$  ( $\text{exp}^{(2)} \in \text{Func}$ )

$\cdot(x, +(1, \text{exp}(3, z)))$  ( $\cdot^{(2)}, +^{(2)} \in \text{Func}$ ;  $1 \in \text{Const}$ ;  $x \in \text{Var}$ )

$x \cdot (1 + 3^z)$  — инфиксная форма записи

$1 \cdot (1 + 3^1)$  — основной терм

# Синтаксис: формулы

Формула — это:

$P(t_1, \dots, t_m)$  (атомарная формула  
, или атом)

( $P^{(m)} \in \text{Pred}$ ,  
 $t_1, \dots, t_m \in \text{Term}$ )

$(\varphi \& \psi)$

$(\varphi \vee \psi)$

$(\varphi \rightarrow \psi)$

$(\neg \varphi)$

$(\forall x \varphi)$

$(\exists x \varphi)$

} составная формула

( $\varphi, \psi$  — формулы,  
 $x \in \text{Var}$ )

Form — множество всех формул в заданном алфавите

# Синтаксис: формулы

## Пояснение

$P(t_1, \dots, t_m)$  “предметы, описываемые термами  $t_1, \dots, t_m$   
находятся в отношении  $P$ ”

$(\varphi \& \psi)$  “ $\varphi$  и  $\psi$ ”

$(\varphi \vee \psi)$  “ $\varphi$  или  $\psi$ ”

$(\varphi \rightarrow \psi)$  “если  $\varphi$ , то  $\psi$ ”

$(\neg \varphi)$  “неверно, что  $\varphi$ ”

$(\forall x \varphi)$  “для любого предмета  $x$  верно  $\varphi$ ”

$(\exists x \varphi)$  “хотя бы для одного предмета  $x$  верно  $\varphi$ ”

# Синтаксис: формулы

## Примеры формул

$P(y, \mathbf{f}(x, y))$

$(P^{(2)} \in \text{Pred},$

$\mathbf{f}^{(2)} \in \text{Func}, x, y \in \text{Var})$

$(\neg P(y, \mathbf{f}(x, y)))$

$(\forall x \neg P(y, \mathbf{f}(x, y)))$

$((\forall x \neg P(y, \mathbf{f}(x, y))) \rightarrow R(x))$

$(R^{(1)} \in \text{Pred})$

$(\exists y ((\forall x \neg P(y, \mathbf{f}(x, y))) \rightarrow R(x)))$

# Синтаксис: формулы

Приоритет логических операций (в порядке убывания)

$\forall, \exists, \neg$

$\&$

$\vee$

$\rightarrow$

Можно опускать скобки согласно приоритету

## Пример

Следующие формулы считаются одинаковыми:

$$\forall x \neg P(x) \& \exists y R(x, y) \rightarrow \exists x (\neg P(x) \vee P(y))$$

$$\forall x (\neg P(x)) \& (\exists y R(x, y)) \rightarrow \exists x ((\neg P(x)) \vee P(y))$$

$$(\forall x (\neg P(x))) \& (\exists y R(x, y)) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y)))$$

$$((\forall x (\neg P(x))) \& (\exists y R(x, y))) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y)))$$

$$(((\forall x (\neg P(x))) \& (\exists y R(x, y))) \rightarrow (\exists x ((\neg P(x)) \vee P(y))))$$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, \mathbf{f}(x, y)) \rightarrow R(x))$$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, \mathbf{f}(x, y)) \rightarrow R(x))$$

Область действия квантора  $\exists$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Переменная  $y$  связана квантором  $\exists$



# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Связанные вхождения этой переменной

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

Область действия квантора  $\forall$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$



Переменная  $x$  связана квантором  $\forall$

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y))) \rightarrow R(x)$$



Связанное вхождение этой переменной

# Синтаксис: формулы

Свободные и связанные переменные

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

Свободное вхождение переменной  $x$



# Синтаксис: формулы

Квантор **связывает** ту переменную, которая следует за ним

**Область действия** внешнего квантора в формуле  $\forall x \varphi$  — это подформула  $\varphi$

Вхождение переменной в область действия связывающего её квантора — **связанное вхождение**

Вхождение переменной, не являющееся связанным, — **свободное вхождение**

Переменная, имеющая свободное вхождение, — **свободная переменная** формулы

**Например**, в рассмотренной формуле

$$\exists y (\forall x \neg P(y, f(x, y)) \rightarrow R(x))$$

свободной является только переменная  $x$

# Синтаксис: формулы

Формально, множество  $\text{Var}_\varphi$  свободных переменных формулы  $\varphi$  определяется так:

если  $\varphi = P(t_1, \dots, t_m)$ , то  $\text{Var}_\varphi = \bigcup_{1 \leq i \leq m} \text{Var}_{t_i}$

если  $\varphi = (\neg\psi)$ , то  $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi$

если  $\varphi = (\psi \& \chi) / (\psi \vee \chi) / (\psi \rightarrow \chi)$ , то  $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi \cup \text{Var}_\chi$

если  $\varphi = (\forall x \psi) / (\exists x \psi)$ , то  $\text{Var}_\varphi = \text{Var}_\psi \setminus \{x\}$

Пусть  $\varphi$  — формула. Тогда:

$\varphi(\tilde{x}^n)$  — синоним  $\varphi$ , если  $\text{Var}_\varphi \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$

если  $\text{Var}_\varphi = \emptyset$ , то  $\varphi$  — замкнутая формула, или предложение

$\text{CForm}^1$  — множество всех замкнутых формул

в заданном алфавите

---

<sup>1</sup> Closed Formulae

# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$\lim(x, s) =$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

в алфавите с такой сигнатурой:

$0 \in \text{Const}$

$\text{ad}^{(2)} \in \text{Func}$ :  $\text{ad}(x, y) = |x - y|$

$R^{(1)}, N^{(1)}, S^{(1)}, E^{(3)}, <^{(2)} \in \text{Pred}$ :

$R(x) =$  “ $x$  — действительное число”

$N(x) =$  “ $x$  — натуральное число”

$S(x) =$  “ $x$  — последовательность действительных чисел”

$E(x, n, s) =$  “ $x$  —  $n$ -й член последовательности  $s$ ”

$x < y$  — сравнение чисел  $x$  и  $y$



# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$\lim(x, s) =$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

Ответ:

$R(x) \ \& \ S(s) \ \& \ \forall \varepsilon (R(\varepsilon) \ \& \ (0 < \varepsilon) \rightarrow$

$\exists n (N(n) \ \& \ \forall m (N(m) \ \& \ (n < m) \rightarrow$

$\forall y (E(y, m, s) \rightarrow (\mathbf{ad}(x, y) < \varepsilon))))))$

# Синтаксис: формулы

## Содержательный пример

Требуется написать формулу

$\lim(x, s) =$

“ $x$  — предел последовательности действительных чисел  $s$ ”

Ответ:

$R(x) \ \& \ S(s) \ \& \ \forall \varepsilon (R(\varepsilon) \ \& \ (0 < \varepsilon) \rightarrow$

$\exists n (N(n) \ \& \ \forall m (N(m) \ \& \ (n < m) \rightarrow$

$\exists y (E(y, m, s) \ \& \ (\mathbf{ad}(x, y) < \varepsilon))))))$

А так тоже верно?

# Семантика: интерпретации

А как в логике предикатов выглядит интерпретация —  
“мир, в котором живёт формула”?

Интерпретация состоит из

- ▶ предметов, населяющих мир
- ▶ операций<sup>1</sup> над предметами
- ▶ отношений<sup>2</sup>, связывающих предметы

Таким образом, в основе интерпретаций логики предикатов лежат алгебраические системы<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> это смысл **функциональных символов**

<sup>2</sup> это смысл **предикатных символов**

<sup>3</sup> не следует пугаться этого термина; это и есть совокупность  
“предметы + операции + отношения”

# Семантика: интерпретации

**Интерпретация** (сигнатуры  $\langle \text{Const}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ ) — это система  $\langle D, \overline{\text{Const}}, \overline{\text{Func}}, \overline{\text{Pred}} \rangle$ , где:

- ▶  $D$  — непустое множество **предметов**  
(**область интерпретации; предметная область; универсум**)
- ▶  $\overline{\text{Const}} : \text{Const} \rightarrow D$  — **оценка констант**
- ▶  $\overline{\text{Func}} : \text{Func} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} (D^n \rightarrow D)$  — **оценка функциональных символов**
- ▶  $\overline{\text{Pred}} : \text{Pred} \rightarrow \bigcup_{n \geq 1} (D^n \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\})$  — **оценка предикатных символов**

$\overline{\mathbf{c}} = \overline{\text{Const}}(\mathbf{c})$  — **предмет**, сопоставленный константе  $\mathbf{c}$

$\overline{\mathbf{f}} = \overline{\text{Func}}(\mathbf{f}) : D^n \rightarrow D$  — **функция**, сопоставленная символу  $\mathbf{f}^{(n)}$

$\overline{\mathbf{P}} = \overline{\text{Pred}}(\mathbf{P}) : D^n \rightarrow \{\mathbf{t}, \mathbf{f}\}$  — **предикат**,

сопоставленный символу  $\mathbf{P}^{(n)}$

# Семантика: интерпретации

## Пример

Сигнатура:  $\text{Const} = \{c_1, c_2\}$ ,  $\text{Func} = \{f^{(1)}\}$ ,  $\text{Pred} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$

Интерпретация:

предметная область:  $D = \{d_1, d_2, d_3\}$

оценка констант:  $\bar{c}_1 = d_1$ ,  $\bar{c}_2 = d_2$

оценка функциональных и предикатных символов:

$\bar{f}(x)$

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

$\bar{P}(x)$

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

$\bar{R}(x, y)$

| x     | y | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------|---|-------|-------|-------|
| $d_1$ |   | t     | t     | f     |
| $d_2$ |   | t     | f     | t     |
| $d_3$ |   | f     | t     | t     |

# Семантика: интерпретации

## Значение термина

Пусть  $t(\tilde{x}^n)$  — терм,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Значение  $t(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  термина  $t$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- ▶ терм-переменная:

$$x_i[\tilde{d}^n] = d_i$$

- ▶ терм-константа:

$$c[\tilde{d}^n] = \bar{c}$$

- ▶ иначе:

$$f(t_1, \dots, t_k)[\tilde{d}^n] = \bar{f}(t_1[\tilde{d}^n], \dots, t_k[\tilde{d}^n])$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► атомарная формула:

$$\mathcal{I} \models P(t_1, \dots, t_k)[\tilde{d}^n]$$
$$\Leftrightarrow \bar{P}(t_1[\tilde{d}^n], \dots, t_k[\tilde{d}^n]) = \mathbf{t}$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► конъюнкция:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \& \psi)[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \models \varphi[\tilde{d}^n]$$

И

$$\mathcal{I} \models \psi[\tilde{d}^n]$$



# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► дизъюнкция:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \vee \psi)[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \models \varphi[\tilde{d}^n]$$

ИЛИ

$$\mathcal{I} \models \psi[\tilde{d}^n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► отрицание:

$$\mathcal{I} \models (\neg\varphi)[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \not\models \varphi[\tilde{d}^n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► импликация:

$$\mathcal{I} \models (\varphi \rightarrow \psi)[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

$$\mathcal{I} \not\models \varphi[\tilde{d}^n]$$

ИЛИ

$$\mathcal{I} \models \psi[\tilde{d}^n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

► квантор всеобщности:

$$\mathcal{I} \models (\forall x_0 \varphi(x_0, \tilde{x}^n))[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

для любого предмета  $d_0$  из области интерпретации верно  $\mathcal{I} \models \varphi(x_0, \tilde{x}^n)[d_0, \tilde{d}^n]$

# Семантика: выполнимость

## Отношение выполнимости формул $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

- ▶ квантор существования:

$$\mathcal{I} \models (\exists x_0 \varphi(x_0, \tilde{x}^n))[\tilde{d}^n]$$

$\Leftrightarrow$

хотя бы для одного предмета  $d_0$

из области интерпретации верно

$$\mathcal{I} \models \varphi(x_0, \tilde{x}^n)[d_0, \tilde{d}^n]$$

# Семантика: выполнимость

Отношение выполнимости формул  $\models$

Пусть  $\varphi(\tilde{x}^n)$  — формула,  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Отношение выполнимости  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$  формулы  $\varphi$  в интерпретации  $\mathcal{I}$  на наборе предметов  $d_1, \dots, d_n$  из области интерпретации определяется так:

$A[x_1/d_1, \dots, x_n/d_n]$  — синоним для  $A(x_1, \dots, x_n)[d_1, \dots, d_n]$

# Семантика: выполнимость

## Пример

Будем рассматривать интерпретации такого вида:

**предметная область** — квадраты и круги белого и чёрного цвета, расположенные на плоскости

**сигнатура** состоит из пяти предикатных символов, отвечающих следующим свойствам:

$C(x)$ : “ $x$  — круг”

$S(x)$ : “ $x$  — квадрат”


$B(x)$ : “ $x$  — чёрный предмет”

$W(x)$ : “ $x$  — белый предмет”

$U(x, y)$ : “предмет  $x$  лежит под предметом  $y$ ”

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :



и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

Как прочитывается эта формула?

Для каждого предмета  $x$ : если он является белым и является квадратом, то существует предмет  $y$ , такой что он является чёрным, и он является кругом, и предмет  $x$  лежит под предметом  $y$

Проще говоря,

Каждый белый квадрат лежит под каким-то чёрным кругом


Как строго убедиться, что это утверждение верно?

Проверить соотношение  $\mathcal{I} \models \varphi$



# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :



и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

Переберём все предметы, подставляя их на место  $x$

1.  $x \leftarrow d_1$ :

- ▶  $\mathcal{I} \not\models W(x)[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \not\models (W(x) \& S(x))[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_1]$

2.  $x \leftarrow d_2$ :

- ▶  $\mathcal{I} \not\models W(x)[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \not\models (W(x) \& S(x))[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_2]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

$d_1$     $d_2$

$d_3$     $d_4$

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

Переберём все предметы, подставляя их на место  $x$

3.  $x \leftarrow d_3$ :

- ▶  $\mathcal{I} \models B(y)[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models C(y)[d_1]$
- ▶  $\mathcal{I} \models U(x, y)[y/d_1, x/d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (B(y) \& C(y) \& U(x, y))[y/d_1, x/d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_3]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_3]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

$d_1$     $d_2$

$d_3$     $d_4$

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$


Переберём все предметы, подставляя их на место  $x$

4.  $x \leftarrow d_4$ :

- ▶  $\mathcal{I} \models B(y)[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models C(y)[d_2]$
- ▶  $\mathcal{I} \models U(x, y)[y/d_2, x/d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (B(y) \& C(y) \& U(x, y))[y/d_2, x/d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (\exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_4]$
- ▶  $\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_4]$

# Семантика: выполнимость

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :



и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

Итого:

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_1]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \models (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))[d_4]$$

А значит,

$$\mathcal{I} \models \forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

# Семантика: выполнимость

## Ещё один пример

Рассмотрим такую интерпретацию  $\mathcal{I}$ :

сигнатура:  $\text{Const} = \emptyset$ ,  $\text{Func} = \{\mathbf{f}^{(1)}\}$ ,  $\text{Pred} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$

предметная область:  $D = \{d_1, d_2, d_3\}$

оценка функциональных и предикатных символов:

$\bar{\mathbf{f}}(x)$

| x     | $\bar{\mathbf{f}}(x)$ |
|-------|-----------------------|
| $d_1$ | $d_2$                 |
| $d_2$ | $d_3$                 |
| $d_3$ | $d_1$                 |

$\bar{P}(x)$

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | <b>t</b>     |
| $d_2$ | <b>f</b>     |
| $d_3$ | <b>t</b>     |

$\bar{R}(x, y)$

| $x \setminus y$ | $d_1$    | $d_2$    | $d_3$    |
|-----------------|----------|----------|----------|
| $d_1$           | <b>t</b> | <b>t</b> | <b>f</b> |
| $d_2$           | <b>t</b> | <b>f</b> | <b>t</b> |
| $d_3$           | <b>f</b> | <b>t</b> | <b>t</b> |

и такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(\mathbf{f}(y))))$$

Проверим соотношение  $\mathcal{I} \models \varphi$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

$\bar{f}(x)$

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

$\bar{P}(x)$

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

$\bar{R}(x, y)$

| $\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                                | t     | t     | f     |
| $d_2$                                | t     | f     | t     |
| $d_3$                                | f     | t     | t     |

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                                | t     | t     | f     |
| $d_2$                                | t     | f     | t     |
| $d_3$                                | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models R(x, y)[y/d_1, x/d_3]$$



# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models R(x, y)[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_2]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(\mathbf{f}(y))))$$

 $\bar{\mathbf{f}}(x)$ 

| x     | $\bar{\mathbf{f}}(x)$ |
|-------|-----------------------|
| $d_1$ | $d_2$                 |
| $d_2$ | $d_3$                 |
| $d_3$ | $d_1$                 |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(\mathbf{f}(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(\mathbf{f}(y))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(\mathbf{f}(y)))[d_2]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $x \ y$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|---------|-------|-------|-------|
| $d_1$   | t     | t     | f     |
| $d_2$   | t     | f     | t     |
| $d_3$   | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_2]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                                | t     | t     | f     |
| $d_2$                                | t     | f     | t     |
| $d_3$                                | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_3]$$



# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $x$   | $y$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| $d_1$ |     | t     | t     | f     |
| $d_2$ |     | t     | f     | t     |
| $d_3$ |     | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \models P(f(y))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\neg P(f(y)))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $x \ y$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|---------|-------|-------|-------|
| $d_1$   | t     | t     | f     |
| $d_2$   | t     | f     | t     |
| $d_3$   | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_1, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_2, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (R(x, y) \& \neg P(f(y)))[y/d_3, x/d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                                | t     | t     | f     |
| $d_2$                                | t     | f     | t     |
| $d_3$                                | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

# Семантика: выполнимость

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

 $\bar{f}(x)$ 

| x     | $\bar{f}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | $d_2$        |
| $d_2$ | $d_3$        |
| $d_3$ | $d_1$        |

 $\bar{P}(x)$ 

| x     | $\bar{P}(x)$ |
|-------|--------------|
| $d_1$ | t            |
| $d_2$ | f            |
| $d_3$ | t            |

 $\bar{R}(x, y)$ 

| $\begin{matrix} x & y \end{matrix}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| $d_1$                               | t     | t     | f     |
| $d_2$                               | t     | f     | t     |
| $d_3$                               | f     | t     | t     |

$$\mathcal{I} \models P(x)[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (\exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

$$\mathcal{I} \not\models (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))[d_3]$$

Значит,

$$\mathcal{I} \not\models \forall x (P(x) \rightarrow \exists y (R(x, y) \& \neg P(f(y))))$$

## Выполнимые и общезначимые формулы

Формула  $\varphi(\tilde{x}^n)$  **выполнима в интерпретации  $\mathcal{I}$** , если существует набор предметов  $\tilde{d}^n$  из области интерпретации  $\mathcal{I}$ , такой что  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$

Формула  $\varphi(\tilde{x}^n)$  **истинна в интерпретации  $\mathcal{I}$** , если для любого набора предметов  $\tilde{d}^n$  из области интерпретации  $\mathcal{I}$  верно  $\mathcal{I} \models \varphi(\tilde{x}^n)[\tilde{d}^n]$

Формула  $\varphi$  **выполнима**, если существует интерпретация, в которой она выполнима

Формула  $\varphi$  **общезначима** (или **тождественно истинна**), если она истинна в любой интерпретации

Формула  $\varphi$  **противоречива** (или **невыполнима**, или **тождественно ложна**), если она не является выполнимой

# Выполнимые и общезначимые формулы

## Пример

$$\varphi: \forall x P(x) \rightarrow \exists x P(x)$$

$$\psi: \exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$$

$$\chi: \forall x P(x) \rightarrow \forall x \neg P(x)$$

Интерпретация  $\mathcal{I}_1$ :  $D = \{d\}$ ,  $\bar{P}(d) = \mathbf{t}$

$$\mathcal{I}_1 \models \varphi$$

$$\mathcal{I}_1 \models \psi$$

$$\mathcal{I}_1 \not\models \chi$$

Интерпретация  $\mathcal{I}_2$ :  $D = \{d_1, d_2\}$ ,  $\bar{P}(d_1) = \mathbf{t}$ ,  $\bar{P}(d_2) = \mathbf{f}$

$$\mathcal{I}_2 \models \varphi$$

$$\mathcal{I}_2 \not\models \psi$$

$$\mathcal{I}_2 \not\models \chi$$

Что мы только что доказали?

Формулы  $\varphi$ ,  $\psi$  выполнимы; формулы  $\psi$ ,  $\chi$  необщезначимы

А как убедиться в общезначимости  $\varphi$  и невыполнимости  $\chi$ ?

И зачем вообще уделять внимание общезначимым и невыполнимым формулам?



# Выполнимые и общезначимые формулы

Выполнимые необщезначимые формулы — это логические формы, которые служат для представления знаний, несущих в себе “нетривиальную” (“полезную”) информацию

Общезначимые формулы — это банальности, тавтологии, знания, не несущие в себе никакой “полезной” информации

При этом общезначимые формулы в логике считаются чрезвычайно важными

## Почему?

Этот вопрос (*в некоторой степени*) разъяснится дальше<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> в теореме о логическом следствии

# Модели

Пусть  $F$  — множество предложений ( $\varphi$  — предложение),  
и  $\mathcal{I}$  — интерпретация

Если каждая формула из  $F$  (формула  $\varphi$ ) выполнима в  $\mathcal{I}$ ,  
то  $\mathcal{I}$  — модель для  $F$  (для  $\varphi$ )

Как можно понимать модель?

Это мир, устройство которого адекватно всем предложениям  
из  $F$

Пицца для размышлений

- ▶ Какие интерпретации являются моделью для пустого множества формул?
  - ▶ Ответ: любые. А почему?
- ▶ Существуют ли множества формул, не имеющие модели?
  - ▶ Ответ: да. А какие?

# Модели

## Пример

Снова рассмотрим интерпретации с квадратами и кругами белого и чёрного цвета на плоскости:

$C(x)$ : “ $x$  — круг”

$S(x)$ : “ $x$  — квадрат”

$B(x)$ : “ $x$  — чёрный предмет”

$W(x)$ : “ $x$  — белый предмет”

$U(x, y)$ : “предмет  $x$  лежит под предметом  $y$ ”

Рассмотрим такую формулу  $\varphi$ :

$$\forall x (W(x) \& S(x) \rightarrow \exists y (B(y) \& C(y) \& U(x, y)))$$

“любой белый квадрат лежит под каким-то чёрным кругом”

и такие интерпретации:



Тогда  $\mathcal{I}_1$  является моделью для  $\varphi$ , а  $\mathcal{I}_2$  не является

# Логическое следствие

Пусть  $F$  — множество предложений, и  $\varphi$  — предложение

Тогда формула  $\varphi$  — **логическое следствие** множества  $F$ , если любая модель для множества  $F$  является моделью для  $\varphi$ , то есть если для любой интерпретации  $\mathcal{I}$  верно:

$$\mathcal{I} \models F \quad \Rightarrow \quad \mathcal{I} \models \varphi$$

Как можно понимать логическое следствие  $\varphi$  множества  $F$ ?

Если  $F$  — имеющиеся у нас “базовые” знания, то  $\varphi$  — необходимо следующее из них “производное” знание

Одна из главных задач (и характерное проявление) интеллектуальной деятельности — это **извлечение логических следствий** из имеющихся баз знаний

Эта задача возникает в огромном числе областей “разумной деятельности”: **экспертные системы**, (автоматическое и ручное) **доказательство теорем**, **формальный анализ программ**, ..., ...

# Логическое следствие

Пусть  $F$  — множество предложений, и  $\varphi$  — предложение

Запись  $F \models \varphi$  используется для обозначения того, что  $\varphi$  — логическое следствие множества  $F$

А какие формулы являются логическими следствиями пустого множества формул?

Общезначимые, и поэтому общезначимость формулы  $\varphi$  обозначается так:<sup>1</sup>

$$\models \varphi$$

А как выглядят логические следствия непустых множеств предложений?

---

<sup>1</sup> Всё немного сложнее: у  $\varphi$  могут быть свободные переменные, а логическими следствиями согласно определению могут быть только предложения, но обозначение всё равно такое

# Логическое следствие

## Пример

Покажем, что представляют собой логические следствия, на простом, но показательном примере

Известно, что:

- ▶ Даша любит Сашу,
- ▶ а Саша любит пиво,
- ▶ а Паша любит пиво и всех тех, кто любит то же, что и он

Любит ли кто-нибудь Дашу?

Попробуем переформулировать эту задачу на языке логики предикатов

Начнём с сигнатуры алфавита; в неё войдут:

- ▶ константы **Даша**, **Саша**, **Паша**, **пиво**
- ▶ предикатный символ  $L^{(2)}$ :  $L(x, y) =$  “икс любит игрека”

# Логическое следствие

## Пример

Условия задачи переписываются так:

- ▶ Даша любит Сашу:  $\varphi_1 : L(\text{Даша}, \text{Саша})$
- ▶ Саша любит пиво:  $\varphi_2 : L(\text{Саша}, \text{пиво})$
- ▶ Паша любит пиво и всех тех, кто любит то же, что и он:  
 $\varphi_3 : L(\text{Паша}, \text{пиво})$   
 $\varphi_4 : \forall x (\exists y (L(\text{Паша}, y) \& L(x, y)) \rightarrow L(\text{Паша}, x))$
- ▶ Любит ли кто-нибудь дашу?:  $\varphi_0 : \exists x L(x, \text{Даша})$

Сама задача тогда записывается так:

проверить соотношение  $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\} \models \varphi_0$

И как же это проверить?

И причём здесь общезначимость формул?

# Логическое следствие

## Теорема о логическом следствии

Пусть  $F = \{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$  — конечное множество предложений, и  $\varphi$  — предложение. Тогда

$$F \models \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \models \psi_1 \& \psi_2 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

**Доказательство.** ( $\Rightarrow$ ):

Рассмотрим произвольную интерпретацию  $\mathcal{I}$

Если  $\mathcal{I} \not\models F$ , то  $\mathcal{I} \not\models \psi_1 \& \dots \& \psi_n$ , а значит,

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Пусть теперь  $\mathcal{I} \models F$

Так как  $F \models \varphi$ , имеем:  $\mathcal{I} \models \varphi$  — а значит, снова верно

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Итого, для произвольной интерпретации  $\mathcal{I}$  верно:

$$\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Но это и означает общезначимость формулы  $\psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$



# Логическое следствие

## Теорема о логическом следствии

Пусть  $F = \{\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n\}$  — конечное множество предложений, и  $\varphi$  — предложение. Тогда

$$F \models \varphi \quad \Leftrightarrow \quad \models \psi_1 \& \psi_2 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

**Доказательство.** ( $\Leftarrow$ ):

Рассмотрим произвольную модель  $\mathcal{I}$  для множества  $F$ :

$$\mathcal{I} \models \psi_1, \quad \dots, \quad \mathcal{I} \models \psi_n$$

Тогда  $\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n$

По рассматриваемому случаю формула  $\psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$  общезначима, а значит,  $\mathcal{I} \models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$

Это возможно только в том случае, если верно  $\mathcal{I} \models \varphi$

Таким образом, произвольная модель  $\mathcal{I}$  для множества  $F$  является моделью для  $\varphi$  ▼

# Проблема общезначимости формул

Что же представляют собой общезначимые формулы?

Это способы преобразования знаний из одной формы в другую, учитывающие причинно-следственные связи, которые можно описать с помощью логики предикатов

Чтобы уметь извлекать новые знания ( $\varphi$ ) из имеющихся ( $F = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ ), нужно понимать, как устроены эти способы преобразования знаний

Более строго, проверка логического следствия  $F \models \varphi$  сводится к проверке общезначимости формулы:

$$\models \psi_1 \& \dots \& \psi_n \rightarrow \varphi$$

Это и означает важность проблемы общезначимости формул:

для заданной формулы  $\varphi$   
проверить её общезначимость:

$$\models \varphi ?$$

Конец лекции 3