

Математическая логика

mk.cs.msu.ru → Лекционные курсы → Математическая логика (318, 319/2, 241, 242)

Блок 13


Метод семантических таблиц
в логике предикатов:
полнота табличного вывода

Лектор:
Подымов Владислав Васильевич
E-mail:
valdus@yandex.ru

Напоминание

Корректность табличного вывода в логике предикатов:

если для таблицы T_0 существует успешный табличный вывод,
то таблица T_0 невыполнима



А верно ли обратное утверждение?

(если таблица невыполнима, то для неё существует успешный вывод)

Теорема (о полноте табличного вывода в ЛП)

Для любой невыполнимой семантической таблицы
существует успешный табличный вывод

Доказательство.

Рассмотрим произвольную невыполнимую семантическую таблицу

$$T_0 = \langle \Gamma_0 \mid \Delta_0 \rangle$$

Покажем, как можно построить успешный вывод \mathfrak{D} для T_0

Для простоты обсудим частный случай с такими ограничениями:

- ▶ множества Γ_0 , Δ_0 конечны
- ▶ все формулы из Γ_0 , Δ_0 замкнуты
- ▶ в сигнатуре нет ни одного функционального символа


Сформулируем **стратегию** построения вывода,
которой (как будет показано) достаточно придерживаться
для построения требуемого вывода \mathfrak{D} , начиная с исходной таблицы T_0

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

1. Дерево вывода строится при помощи обхода в ширину

То есть правила применяются к незакрытым неатомарным таблицам в порядке их появления в построенном фрагменте дерева



Тогда каждая таблица каждой ветви вывода рано или поздно будет построена


Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

- Правила применяются к формулам в порядке очереди

То есть:

- неатомарные формулы таблицы пронумерованы
- правило вывода применяется к **первой формуле**
- результат применения правила записывается **последним**



Тогда в каждой ветви вывода к каждой неатомарной формуле рано или поздно будет применено правило табличного вывода

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Включим в стратегию построения успешного вывода три ограничения, разрешив выбирать остальные детали построения произвольно:

3. При применении правил $L\forall$, $R\exists$ подставляются все имеющиеся в таблице константы (**c**, если констант нет)

$$\begin{array}{c} \langle \forall x \varphi, \exists x \psi \mid \exists x \chi \rangle \\ \downarrow L\forall \\ \langle \forall x \varphi, \exists x \psi, \varphi\{x/c\} \mid \exists x \chi \rangle \\ \downarrow L\exists \\ \langle \forall x \varphi, \psi\{x/d\}, \varphi\{x/c\} \mid \exists x \chi \rangle \\ \downarrow R\exists \times 2 \\ \langle \forall x \varphi, \psi\{x/d\}, \varphi\{x/c\} \mid \exists x \chi, \chi\{x/c\}, \chi\{x/d\} \rangle \\ \dots \end{array}$$

Тогда в каждой бесконечной ветви вывода
для каждого квантора \forall слева и \exists справа
каждая константа рано или поздно будет подставлена

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

Покажем, что любой вывод \mathfrak{D} , построенный для $T_0 = \langle \Gamma_0 \mid \Delta_0 \rangle$ согласно предложенной стратегии, успешен

Предположим, что это не так: вывод \mathfrak{D} неуспешен — получим из этого выполнимость таблицы T_0 , противоречащую выбору таблицы T_0

Заменим в \mathfrak{D} каждую незакрытую атомарную таблицу T_{atom} на бесконечную ветвь $T_{atom} \rightarrow T_{atom} \rightarrow T_{atom} \rightarrow \dots$

Тогда в полученном дереве обязательно найдётся бесконечная ветвь \mathcal{T} , состоящая только из незакрытых таблиц:

$$T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots$$

По этой ветви построим интерпретацию \mathcal{I} , такую что:

- ▶ каждая формула из Γ_0 выполнима в \mathcal{I}
- ▶ каждая формула из Δ_0 невыполнима в \mathcal{I}

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$

$\mathcal{I} = \langle D, \overline{\text{Const}}, -, \overline{\text{Pred}} \rangle$, где

- ▶ предметная область — это все константы всех формул в \mathfrak{T} :

$$D = \bigcup_{i \geq 0} \text{Const}_i = \text{Const}_\omega, \text{ где } \text{Const}_i — \text{все константы в } T_i$$

- ▶ значение каждой константы — это её изображение (она сама):

$$\bar{c} = c$$

- ▶ предикат истинен \Leftrightarrow он встречается в левых частях таблиц \mathfrak{T} :

$$\bar{P}(c_1, \dots, c_k) = t \Leftrightarrow P(c_1, \dots, c_k) \in \bigcup_{i \geq 0} \Gamma_i = \Gamma_\omega$$

Осталось показать *индукцией по структуре формулы*, что

- ▶ каждая формула из Γ_ω выполнима в \mathcal{I}
- ▶ каждая формула из $\Delta_\omega = \bigcup_{i \geq 0} \Delta_i$ невыполнима в \mathcal{I}

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

База индукции: φ — атом

Тогда $\varphi = P(c_1, \dots, c_k)$, где $c_1, \dots, c_k \in \text{Const}_\omega$ (почему?)

Подслучай 1: $P(c_1, \dots, c_k) \in \Gamma_\omega$

Тогда $\overline{P}(c_1, \dots, c_k) = \text{t}$, а значит, $\mathcal{I} \models \varphi$

Подслучай 2: $P(c_1, \dots, c_k) \in \Delta_\omega$

Тогда $P(c_1, \dots, c_k) \notin \Gamma_\omega$ (почему?)

Значит, $\overline{P}(c_1, \dots, c_k) = \text{f}$ и $\mathcal{I} \not\models \varphi$

Индуктивный переход

Предположение индукции: для каждой формулы, содержащей менее N логических операций, утверждение доказано

Рассматриваемый случай: формула φ содержит ровно N логических операций

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

Переход 1: $\varphi = \psi \rightarrow \chi$

Подслучай 1: $\varphi \in \Gamma_\omega$

В ветви \mathfrak{T} существует таблица T_i , такая что правило вывода применяется к φ в левой части этой таблицы (почему?)

Значит, верно хотя бы одно из двух: (почему?)

- ▶ $\chi \in \Gamma_{i+1}$, и тогда $\mathcal{I} \models \chi$ и $\mathcal{I} \models \varphi$
- ▶ $\psi \in \Delta_{i+1}$, и тогда $\mathcal{I} \not\models \psi$ и $\mathcal{I} \models \varphi$

Подслучай 2: $\varphi \in \Delta_\omega$ — рассуждения аналогичны

Переход 2/3/4: $\varphi = \psi \& \chi / \psi \vee \chi / \neg \psi$ — рассуждения аналогичны

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$
$$\varphi \in \Gamma_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \models \varphi \qquad \varphi \in \Delta_\omega \stackrel{?}{\Rightarrow} \mathcal{I} \not\models \varphi$$

Переход 5: $\varphi = \forall x \psi$

Подслучай 1: $\varphi \in \Gamma_\omega$

Тогда $\varphi\{x/c\} \in \Gamma_\omega$ для любой константы $c \in \text{Const}_\omega$ (почему?)

Значит, для любой константы $c \in \text{Const}_\omega$ верно: $\mathcal{I} \models \varphi\{x/c\}$

Но это и означает $\mathcal{I} \models \forall x \varphi$

Подслучай 2: $\varphi \in \Delta_\omega$

В ветви \mathfrak{T} существует таблица T_i , такая что правило вывода применяется к φ в правой части этой таблицы

Значит, $\varphi\{x/c\} \in \Delta_{i+1}$ для некоторой $c \in \text{Const}_{i+1} \subseteq \text{Const}_\omega$

Тогда $\mathcal{I} \not\models \varphi\{x/c\}$, и следовательно, $\mathcal{I} \not\models \forall x \varphi$

Переход 6: $\varphi = \exists x \psi$ — рассуждения аналогичны

Доказательство теоремы о полноте табличного вывода в ЛП.

$$\mathfrak{T}: T_0 \rightarrow T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow \dots, \quad T_i = \langle \Gamma_i \mid \Delta_i \rangle$$

Итоги рассуждений

Существует (и явно описана) интерпретация \mathcal{I} , такая что

- ▶ все формулы в левых частях таблиц из \mathfrak{T} выполнимы в \mathcal{I}
- ▶ все формулы в правых частях таблиц из \mathfrak{T} невыполнимы в \mathcal{I}

В частности, все формулы из Γ_0 выполнимы в \mathcal{I}

и все формулы из Δ_0 невыполнимы в \mathcal{I}

Значит, таблица T_0 выполнима, что противоречит
невыполнимости этой таблицы, заявленной в начале доказательства

Противоречие получено в предположении о том,
что вывод, построенный для T_0 , неуспешен

Значит, предположение неверно:

любой вывод, построенный для невыполнимой таблицы T_0
согласно предложенным правилам, успешен ▼

А как адаптировать доказательство к общему случаю?

То есть:

- ▶ Какой порядок обработки формул позволит «справедливо» обращаться со счётными множествами формул?
- ▶ Какие термы подставлять, если в сигнатуре алфавита есть функциональные символы?
- ▶ Как задать и использовать интерпретацию \mathcal{I} , если в таблицах встречаются незамкнутые формулы?

Следствие

Семантическая таблица T логики предикатов невыполнима \Leftrightarrow
для неё существует успешный табличный вывод

Доказательство.

Вытекает из теорем о **корректности** и **полноте** табличного вывода ▼

Следствие. Для любой формулы φ логики предикатов верно:

$$\models \varphi \Leftrightarrow \text{для семантической таблицы } \langle | \varphi \rangle \\ \text{существует успешный табличный вывод}$$

Доказательство. Вытекает из первого следствия

и теоремы о табличной проверке общезначимости формул ЛП ▼