

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

по курсу «Дополнительные главы дискретной математики»

Часть I. Конечные автоматы-распознаватели и автоматы-преобразователи

Занятие 1. Множества, допускаемые конечными автоматами. Правоинвариантная эквивалентность.

В ауд.: № 1 (1,2,5,6,9), № 2 (1,4,5), № 3 (1,3,5,6), № 4, № 5 (1,3,4).

Занятие 2. Теоретико-множественные операции над конечно-автоматными множествами. Недетерминированные автоматы. Операции произведения и итерации.

В ауд.: № 8, № 9, № 10 (1), № 11, № 12 (1,3), № 21 (1), № 22 (1), № 13–15.

Занятие 3. Регулярные выражения и регулярные множества. Теорема Клини.

В ауд.: № 16 (1,3,5), № 17–20.

Занятие 4. Задание детерминированных функций деревьями. Вес дерева. Диаграммы Мура и канонические уравнения.

В ауд. № 1.1 (1,3,8,9), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.10 (1), 2.1 (1,2,6), 2.4(2).

На дом № 1.1 (4,6,9,13), 1.2 (2), 1.4 (3), 1.10 (3), 2.1 (3,7), 2.4 (1,3).

Занятие 5. Представление конечно-автоматных функций диаграммами Мура и каноническими уравнениями. Операции над конечно-автоматными функциями.

В ауд. № 2.1 (16,35), 2.5 (2), 2.8 (1,6,7), 2.9 (1,4), 2.10 (2).

На дом № 2.1 (15,34), 2.5 (3), 2.8 (2,5,8), 2.9 (2,5), 2.10 (1).

Занятие 6. Реализация конечно-автоматных функций схемами. Полнота в множестве конечно-автоматных функций.

В ауд. № 2.13 (1,4,5), 2.14 (1,4), 2.17 (1,4).

На дом № 2.13 (2,6,11), 2.14 (2,5), 2.17 (2,5).

ЗАДАЧИ ПО АВТОМАТАМ-РАСПОЗНАВАТЕЛЯМ

1. Построить диаграмму Мура для автомата в алфавите $\{0, 1\}$, который допускает следующее множество:

- 1) а) множество $\{0, 1, \Lambda\}$; б) множество $\{0, 1\}^* \setminus \{0, 1, \Lambda\}$;
- 2) все слова, которые начинаются словом 01;
- 3) все слова, которые оканчиваются словом 101;
- 4) все слова длины 3 и слово 0;
- 5) все слова длины 3, кроме слова 110;
- 6) все слова, которые содержат слово 001;
- 7) все слова, которые составлены из «блоков» 011 и 101;
- 8) все слова, имеющие нечётную длину и слово 11;
- 9) все слова, которые имеют вхождения слов 000 и 111;
- 10) все слова, у которых за каждым символом 1 следуют как минимум два символа 0.

2. Доказать конечную автоматность следующих множеств:

- 1) любое конечное множество X слов в алфавите $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ и множество $A^* \setminus X$;
- 2) множество всех слов вида a_i^n ($1 \leq i \leq m$, $n = 1, 2, \dots$) в алфавите $\{a_1, \dots, a_m\}$;
- 3) множество всех слов в алфавите $\{0, 1\}$, которые имеют чётную длину, начинаются символом 0 и оканчиваются символом 1;
- 4) множество всех слов в алфавите $\{0, 1\}$, которые содержат неперекрывающиеся вхождения слов 000, 001 и 011;
- 5) множество слов вида $0^{n_1}10^{n_2}1\dots10^{n_{k-1}}10^{n_k}$, где $n_1, \dots, n_k \geq 1$ и
- а) число k фиксировано, б) число k произвольно;
- 6) множество слов вида $(10^{m_1}1)^{n_1}0(10^{m_2}1)^{n_2}0\dots(10^{m_k}1)^{n_k}$, где $m_1, \dots, m_k \geq 2$, $n_1, \dots, n_k \geq 1$ и число k фиксировано.

3. Определить на множестве $\{0, 1\}^*$ правоинвариантное отношение эквивалентности конечного индекса, для которого следующие множества будут представимы в виде объединения некоторого числа классов эквивалентности:

- 1) $\{\Lambda\}$; 2) $\{0\}$; 3) $\{\Lambda, 0, 1\}$; 4) множество всех слов вида 0^{3n} , где $n \geq 1$; 5) множество всех слов вида 0^n1 , где $n \geq 0$; 6) множество всех слов чётной длины (включая пустое слово) вместе со словами 1 и 111.

4. Для любого $n \geq 2$ определить на множестве $\{0, 1\}^*$ правоинвариантное отношение эквивалентности индекса n .

5. Пользуясь правоинвариантным отношением эквивалентности, доказать, что следующие множества являются конечно-автоматными:

- 1) $\{0^n1^{2n} : n = 1, 2, \dots\}$; 2) $\{0^n10^n : n = 1, 2, \dots\}$; 3) множество всех симметричных слов в алфавите $\{0, 1\}$; 4) $\{0^{n^2} : n = 1, 2, \dots\}$; 5) $\{1^{p_i} : i = 0, 1, \dots\}$, где p_i — i -е простое число.

6. Существует ли бесконечное конечно-автоматное множество X , такое, что множество $\{\bar{a}\bar{a} : \bar{a} \in X\}$ конечно-автоматно?

7*. По аналогии с правоинвариантным отношением эквивалентности определим на множестве A^* левоинвариантное отношение эквивалентности: если $\bar{a} \sim \bar{b}$ и \bar{c} — произвольное слово из A^* , то $\bar{c}\bar{a} \sim \bar{c}\bar{b}$.

Будет ли для левоинвариантного отношения эквивалентности справедлив аналог теоремы 2 из лекций (о представлении произвольного конечно-автоматного множества в виде объединения некоторого количества классов левоинвариантного отношения эквивалентности конечного индекса)?

8. Ввести операцию прямого произведения автоматов. С использованием этой операции доказать замкнутость класса конечно-автоматных множеств относительно операций объединения и пересечения.

9. Выяснить, сохраняют ли операции $\cup, \cap, \cdot, *$ класс всех множеств, которые не являются конечно-автоматными.

10. Какие множества допускают следующие недетерминированные автоматы (предварительно построить для них диаграммы Мура):

- 1) $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, $f(0, q_1) = \{q_2\}$, $f(1, q_1) = \{q_1, q_2\}$, $f(0, q_2) = \{q_3\}$, $f(1, q_2) = \{q_3\}$, $f(0, q_3) = \{q_3\}$, $f(1, q_3) = \{q_2, q_3\}$, $F = \{q_3\}$;

2) $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, $f(0, q_1) = \{q_1, q_2\}$, $f(1, q_1) = \{q_1\}$, $f(0, q_2) = \{q_2\}$, $f(1, q_2) = \{q_2, q_3\}$, $f(0, q_3) = \{q_1, q_3\}$, $f(1, q_3) = \{q_1, q_3\}$, $F = \{q_3\}$.

11. Для заданных недетерминированных автоматов методом детерминизации построить эквивалентный детерминированный автомат (можно давать любые задачи, в том числе задачу 10).

12. Пусть $\mathcal{A} = \{A, Q, f, q_1, F\}$ — недетерминированный автомат, F_1, F_2 — непустые подмножества множества Q и $D = D(\mathcal{A})$. Выяснить, справедливы ли следующие равенства:

- 1) $D' = A^* \setminus D$, где $D' = D(\mathcal{A}')$ и $\mathcal{A}' = \{A, Q, f, q_1, Q \setminus F\}$;
- 2) $D = D_1 \cup D_2$, где $D_i = D(\mathcal{A}_i)$, $\mathcal{A}_i = \{A, Q, f, q_1, F_i\}$ и $F_1 \cup F_2 = F$;
- 3) $D = D_1 \cap D_2$, где $D_i = D(\mathcal{A}_i)$, $\mathcal{A}_i = \{A, Q, f, q_1, F_i\}$ и $F_1 \cap F_2 = F$.

13. Отправляясь от множеств $\{0\}$ и $\{1\}$, построить с помощью операций объединения, произведения и итерации множество всех слов в алфавите $\{0, 1\}$, которые содержат подслово 0001.

14. Пусть \bar{a} — слово в алфавите $A = \{a_1, \dots, a_m\}$. Сколько раз нужно применить операцию итерации, чтобы получить множество $A^* \setminus \{\bar{a}\}$ из множеств $\{a_1\}, \dots, \{a_m\}$ с помощью операций объединения, произведения и итерации?

15. Пусть множество X состоит из n слов. Может ли множество $X \cdot X$ содержать n^2 слов; меньше, чем n^2 слов; меньше, чем n слов?

16. Доказать регулярность следующих множеств слов в алфавите $\{0, 1\}$:

- 1) любое конечное множество слов и дополнение (до множества $\{0, 1\}^*$) к конечному множеству слов;
- 2) множество всех слов, представимых в виде произведения заданных слов $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$;
- 3) множество всех слов, содержащих в качестве подслова одно из слов $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$;
- 4) множество всех слов, длины которых имеют вид $5k + 1$ или $5k + 3$;
- 5) множество всех слов, которые не содержат слово 01.

17. Привести пример бесконечного регулярного множества, которое невозможно получить с однократным использованием операции $*$.

18. Пусть X — регулярное множество в алфавите $\{a_1, \dots, a_m\}$, Y_1, \dots, Y_m — произвольные регулярные множества. Доказать, что множество $S_{Y_1 \dots Y_m}^{a_1 \dots a_m} X$, полученное в результате одновременной замены букв a_1, \dots, a_m в любом слове из X множествами Y_1, \dots, Y_m , является регулярным множеством.

19. Пусть X — регулярное множество, $\text{Rev}(X)$ — множество обращений всех слов из X (т.е. слов, прочитанных справа налево). Доказать, что множество $\text{Rev}(X)$ регулярно.

20. Пусть X — конечно-автоматное множество в алфавите A , Y — конечно-автоматное множество в однобуквенном алфавите. Обозначим через X/Y множество всех тех слов из X , длины которых являются длинами слов из Y . Доказать, что множество X/Y конечно-автоматно.

21. Для автоматов \mathcal{A} и \mathcal{B} построить (недетерминированный) автомат, который допускает множество $D(\mathcal{A}) \cdot D(\mathcal{B})$:

- 1) автомат \mathcal{A} : $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, $f(0, q_1) = q_2$, $f(1, q_1) = q_1$, $f(0, q_2) = q_2$, $f(1, q_2) = q_3$,
 $f(0, q_3) = q_1$, $f(1, q_3) = q_3$, $F = \{q_1, q_3\}$,
автомат \mathcal{B} : $Q = \{q_1, q_2\}$, $f(0, q_1) = q_1$, $f(1, q_1) = q_2$, $f(0, q_2) = q_2$, $f(1, q_2) = q_2$,
 $F = \{q_2\}$;
- 2) автомат \mathcal{A} : $Q = \{q_1, q_2\}$, $f(0, q_1) = q_1$, $f(1, q_1) = q_2$, $f(0, q_2) = q_1$, $f(1, q_2) = q_2$,
 $F = \{q_2\}$;
автомат \mathcal{B} : $Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, $f(0, q_1) = q_2$, $f(1, q_1) = q_3$, $f(0, q_2) = q_2$, $f(1, q_2) = q_2$,
 $f(0, q_3) = q_3$, $f(1, q_3) = q_1$, $F = \{q_2, q_3\}$.

22. Для автомата \mathcal{A} построить (недетерминированный) автомат \mathcal{C} , у которого $D(\mathcal{C}) = D(\mathcal{A})^*$:

- 1) автомат \mathcal{A} из задачи 21.1; 2) автомат \mathcal{B} из задачи 21.2.